

TỦ SÁCH LUYỆN THI

BỘ ĐỀ THI KHÓ VÀ HAY NHẤT HSG TOÁN 7 NĂM 2020

(CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT)



TỦ SÁCH LUYỆN THI

**BỘ ĐỀ THI KHÓ VÀ HAY NHẤT
HSG TOÁN 7 NĂM 2020**

(CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT)

Bài 1 (6,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$.

2) Tìm x biết: $\left| \frac{5}{3} - x \right| - \left| \frac{-5}{6} \right| = \left| \frac{-5}{9} \right|$

3) Tìm số nguyên x biết: $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left| x - \frac{2}{3} \right| < \frac{26}{\sqrt{81}}$.

Bài 2 (3,0 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi x_1 và x_2 là hai giá trị của x; y_1 và y_2 là hai giá trị tương ứng của y.

a) Tính x_1 và y_1 biết $2x_1 = 5y_1$ và $2x_1 - 3y_1 = 12$.

b) Tính y_1 biết $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$.

Bài 3 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$. Kẻ AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Lấy điểm D trên AC sao cho $AD = AB$. Kẻ DE và DK lần lượt vuông góc với BC và AH ($E \in BC, K \in AH$).

a) So sánh độ dài BH và AK.

b) Tính số đo góc HAE.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 15^\circ$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, D sao cho $BA = AM = MD$. Kẻ DE vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh rằng $\triangle AME$ đều.

b) Chứng minh rằng $EC = ED$.

Bài 5 (3,0 điểm) Cặp số $(x; y)$ nào thỏa mãn đẳng thức sau: $3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$.

.....**HẾT**.....



Họ và tên thí sinh.....

Chữ ký giám thị 1:.....

Số báo danh:.....

Chữ ký giám thị 2:.....

Bài	ý	Nội dung	Điểm
1 (6đ)	1) (2đ)	$A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$ $= \frac{\frac{3}{8} - \frac{3}{10} + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-\frac{5}{8} + \frac{5}{10} - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{3} - \frac{3}{4}}{\frac{5}{2} + \frac{5}{3} - \frac{1}{4}}$	1,0
		$A = \frac{3(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})}{-5(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})} + \frac{3(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}{5(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}$	0,5
		$A = \frac{-3}{5} + \frac{3}{5} = 0$	0,5
	2) (2đ)	a) $\left \frac{5}{3} - x \right - \left \frac{-5}{6} \right = \left \frac{-5}{9} \right \Leftrightarrow \left \frac{5}{3} - x \right = \frac{5}{9} + \frac{5}{6}$	0,5
		$\left \frac{5}{3} - x \right = \frac{25}{18}$	0,5
		v/h1: $\frac{5}{3} - x = \frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{5}{18}$	0,5
		v/h2: $\frac{5}{3} - x = -\frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{55}{18}$	0,5
		Vậy $x = \frac{5}{18}; x = \frac{55}{18}$.	
	3) (2đ)	Với $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left x - \frac{2}{3} \right \Leftrightarrow \left x - \frac{2}{3} \right > \frac{7}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{2}{3} > \frac{7}{6} \\ x - \frac{2}{3} < -\frac{7}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{11}{6} \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
		Với $\left x - \frac{2}{3} \right < \frac{26}{\sqrt{81}} \Leftrightarrow -\frac{26}{9} < x - \frac{2}{3} < \frac{26}{9} \Leftrightarrow -\frac{29}{9} < x < \frac{32}{9}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$	0,5
		Vậy $x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
2 (3đ)		a, Vì $2x_1 = 5y_1 \Rightarrow \frac{x_1}{5} = \frac{y_1}{2} \Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6}$	0,5

		$\Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6} = \frac{2x_1 - 3y_1}{10 - 6} = \frac{12}{4} = 3$	0,5
		$\Rightarrow x_1 = 15; y_1 = 6$	0,5
		b, Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$	0,5
		Mà $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$ nên: $2x_2 \cdot y_1 = x_2 \cdot 10$	0,5
		Tính được: $y_1 = \frac{10x_2}{2x_2} = 5$	0,5
3 (4d)			
	a) (2d)	a) Chứng minh $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (vì cùng phụ với $\widehat{KAD}$) Xét $\triangle ABH$ và $\triangle DAK$ có: $\widehat{AHB} = \widehat{DKA} = 90^\circ$ $BA = DA$ (gt) $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle ABH = \triangle DAK$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $BH = AK$ (hai cạnh tương ứng)	0,5
	b) (2d)	b) Chứng minh được: $KD \parallel HE \Rightarrow \widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (hai góc so le trong) Xét $\triangle KDH$ và $\triangle EHD$ có: $\widehat{DKH} = \widehat{HED} = 90^\circ$ DH chung $\widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle KDH = \triangle EHD$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $KD = EH$ (hai cạnh tương ứng) Mà $HA = KD$ ($\triangle ABH = \triangle DAK$); Suy ra $HE = HA \Rightarrow \triangle AHE$ vuông cân tại H. Từ đó tính được $\widehat{HAE} = 45^\circ$	1,0 0,5
4 (4d)			
		$\triangle ABC$ có $\widehat{DAC} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB}$ (tính chất góc ngoài tam giác) $\Rightarrow \widehat{DAC} = 60^\circ$ (1)	0,5

5 (3đ)	a) (2,0đ)	Lấy điểm F thuộc tia đối của tia ME sao cho: $MF = ME$ Chứng minh được $\triangle AMF = \triangle DME$ (c.g.c) $\Rightarrow \begin{cases} AF = DE \\ \widehat{AFM} = \widehat{DEM} \end{cases}$	0,5
		Vì $\widehat{AFM} = \widehat{DEM}$ (cmt) $\Rightarrow AF \parallel DE$ Vì $AF \parallel DE$ (cmt), mà $DE \perp AC$ (gt) $\Rightarrow AF \perp AC \Rightarrow \widehat{FAE} = 90^\circ$ Chứng minh được $\triangle AFE = \triangle EDA$ (c.g.c)	0,5
		$\Rightarrow EF = AD \Rightarrow ME = MA \Rightarrow \triangle AME$ cân tại M (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow \triangle AME$ đều	0,5
	b) (2,0đ)	Nối E với B Ta có $\triangle AME$ đều (theo câu a) $\Rightarrow AM = AE$; mà $AM = AB$ (gt) Từ đó ta có: $AB = AE \Rightarrow \triangle ABE$ cân tại A $\widehat{BAC} = 180^\circ - (45^\circ + 15^\circ) = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ABE} = \widehat{AEB} = 30^\circ$	0,5
		$\triangle ADE$ vuông tại E, $\widehat{DAC} = 60^\circ$ (theo câu a) $\Rightarrow \widehat{ADE} = 30^\circ$ $\triangle BED$ có: $\widehat{DBE} = \widehat{BDE} (= 30^\circ) \Rightarrow \triangle BED$ cân tại E $\Rightarrow ED = EB$ (3)	0,5
		Ta có: $\widehat{EBC} = \widehat{ABC} - \widehat{ABE} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ \Rightarrow \triangle BEC$ cân tại E $\Rightarrow EB = EC$ (4)	0,5
		Từ (3) và (4) $\Rightarrow EC = ED$	0,5
		$3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 7^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^{x+2} \cdot 7^x$	1,0
		$\Leftrightarrow \frac{3^{2x+1}}{3^{x+2}} = \frac{7^x}{7^y}$ $\Leftrightarrow 3^{x-1} = 7^{x-y}$	1,0
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ x-y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ Kết luận.	1,0

Lưu ý: - Các cách giải khác với đáp án mà đúng thì cho điểm tương đương
- Điểm toàn bài giữ nguyên không làm tròn.

Bài 1: (4 điểm) Tìm x, biết:

$$a) \frac{11}{13} - \left(\frac{5}{42} - x \right) = - \left(\frac{15}{28} - \frac{11}{13} \right)$$

$$b) \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{5}{12} \cdots \frac{30}{62} \cdot \frac{31}{64} = 2^x$$

Bài 2: (4 điểm) Thực hiện phép tính:

$$A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11}$$

$$B = \frac{3 + 0,75 - \frac{3}{19}}{\frac{5}{2} + 0,625 - \frac{5}{38}} \cdot \frac{15 + \frac{15}{17} - \frac{15}{144} + \frac{15}{34}}{2 + \frac{3}{17} - \frac{2}{144}} + 2018$$

Bài 3: (4 điểm)

a) Cho $(x_1a - y_1b)^{2n} + (x_2a - y_2b)^{2n} + (x_3a - y_3b)^{2n} + \dots + (x_ma - y_mb)^{2n} \leq 0$

(với $m, n \in \mathbb{N}^*$). Chứng minh: $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_m}{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_m} = \frac{b}{a}$

b) Cho 3 số x, y, z là 3 số khác 0 thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{y+z-x}{x} = \frac{z+x-y}{y} = \frac{x+y-z}{z}$$

Hãy tính giá trị biểu thức: $B = \left(1 + \frac{x}{y} \right) \left(1 + \frac{y}{z} \right) \left(1 + \frac{z}{x} \right)$.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC ($AB > AC$), M là trung điểm của BC. Đường thẳng đi qua M vuông góc với tia phân giác của góc A tại H cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E và F.

Chứng minh:

a) $EH = HF$

b) $2\widehat{BME} = \widehat{ACB} - \widehat{B}$.

c) $\frac{FE^2}{4} + AH^2 = AE^2$.

d) $BE = CF$.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

===== HẾT =====

Họ tên học sinh: SBD: Phòng thi số:

Chú ý: Thí sinh dự thi không được sử dụng máy tính cầm tay!

Điểm	Lời phê

Phần I : Trắc nghiệm (2đ) Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Kết quả nào sau đây là đúng?

- A. $\frac{1}{2} \in \mathbb{N}$ B. $-5 \in \mathbb{I}$ C. $-2 \in \mathbb{Q}$ D. $\frac{2}{3} \in \mathbb{Z}$

Câu 2: Từ tỉ lệ thức: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ta có thể suy ra các đẳng thức:

- A. $ac = bd$ B. $ad = bc$ C. $ab = cd$ D. Tất cả đều sai

Câu 3: 1. Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi $x = -3$ thì $y = 12$. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là :

- A. $k = -0,25$ B. $k = -4$ C. $k = -36$ D. $k = 4$

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 5$. Khi đó :

- A. $f(1) = 4$ B. $f(-2) = -9$ C. $f(1) > f(-1)$ D. $f(2) = f(-2)$

Câu 5: Kết quả phép tính $(-2) : \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right)^2$ là:

- A. $\frac{1}{3}$ B. - 72 C. 72 D. $-\frac{1}{18}$

Câu 6: Điểm A (1; -6) nằm trên đồ thị của hàm số:

- A. $y = x - 1$ B. $y = x + 1$ C. $y = x - 7$ D. $y = x + 7$

Câu 7: Nếu $a \parallel b$ và $a \perp c$ thì:

- A. $a \parallel b$ B. $a \perp b$ C. $b \perp c$ D. $a \parallel b \parallel c$

Câu 8: Cho ΔABC , biết $\hat{B} = 45^\circ$; $\hat{C} = 55^\circ$,

a) số đo góc $\hat{A}$ là: A. 100° B. 90° C. 85° D. 80°

b) Số đo góc ngoài đỉnh B của ΔABC là:

- A. 100° B. 125° C. 130° D. 135°

Phần II : Tự luận (8đ)

Bài 1:(2đ) Tính giá trị của các biểu thức sau một cách hợp lí nếu có thể:

- a) $\left(\frac{42}{32} : \frac{7}{8}\right) \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{15}{34} - \frac{1}{3} + \frac{19}{34} - \frac{5}{7} - \frac{2}{3}$ c) $\left(\frac{-5}{6}\right)^5 : \left(\frac{5}{12}\right)^5$ d) $16\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 13\frac{3}{5} \cdot \sqrt{\frac{1}{9}}$

Bài 2. (2đ) Tìm x

- a) $|x + 5| - 6 = 9$ b) $\frac{3}{7} + \frac{1}{7} : x = \frac{3}{14}$ c) $\left(2\frac{1}{2}x - \frac{5}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$ d) $1\frac{1}{3} : 0,8 = \frac{2}{3} : (0,1x)$

Bài 3: (1đ) Ba chi đội 7A, 7B, 7C tham gia làm kế hoạch nhỏ thu nhặt giấy vụn tổng cộng được 120kg giấy vụn. Tính số giấy mỗi chi đội thu được, biết rằng số giấy mỗi chi đội thu được tỉ lệ với 7; 8; 9.

Bài 4: (1đ) Vẽ đồ thị hàm số $y = -2x$

a) $\Delta ABM = \Delta DCM$
b) $AB \parallel DC$
c) $AM \perp BC$.
d) CM là phân giác của góc ACD

[illegible]

Bài 1. (2,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) $\left(\frac{-1}{3}\right)^2 \cdot 18 - \left(\frac{-1}{3}\right)^3 : \left|+\frac{1}{27}\right|$

b) $\left|\frac{-5}{8}\right| \cdot \sqrt{(-64)^2} - (16)^0 \cdot \sqrt{\frac{16}{25}}$

c) $\frac{9^8 \cdot 8^6}{16^4 \cdot 3^{17}}$

Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết: $0,5 + \left|x + \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{-3}{\sqrt{16}}\right|$


Bài 3. (1,0 điểm) Biết rằng $\frac{x+y}{t+z} = \frac{4}{7}$ và $7y = 4z$. Tìm tỉ số $\frac{x}{t}$

Bài 4. (2,0 điểm)

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I.

Bài 5 . (0,5 điểm)

Hai đường thẳng AB, CD cắt nhau ở ngoài phạm vi của tờ giấy (xem hình bên). Làm thế nào để biết được góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng ấy?



Bài 6. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A . Tia phân giác của $\widehat{ABC}$ cắt cạnh AC tại D . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho $BE = BA$

- a) Chứng minh rằng: $\triangle BDA = \triangle BDE$ và $DE \perp BE$
- b) Tia BA cắt tia ED tại F . Chứng minh rằng: $\triangle ADF = \triangle EDC$
- c) Gọi H là giao điểm của tia BD và đoạn thẳng CF . Vẽ EK vuông góc với CF tại K . Chứng minh rằng: $BH \parallel EK$

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1. (2,5 điểm)

Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } \left(\frac{-1}{3} \right)^2 \cdot 18 - \left(\frac{-1}{3} \right)^3 : \left| +\frac{1}{27} \right|$$

$$= \frac{1}{9} \cdot 18 - \left(\frac{-1}{27} \right) : \frac{1}{27}$$

$$= 2 - \left(\frac{-1}{27} \right) \cdot 27$$

$$= 2 - (-1)$$

$$= 3$$

$$\text{b) } \left| \frac{-5}{8} \right| \cdot \sqrt{(-64)^2} - (16)^0 \cdot \sqrt{\frac{16}{25}}$$

$$= \frac{5}{8} \cdot 64 - 1 \cdot \frac{4}{5}$$

$$= 40 - \frac{4}{5}$$

$$= \frac{196}{5}$$

$$\text{c) } \frac{9^8 \cdot 8^6}{16^4 \cdot 3^{17}}$$

$$= \frac{(3^2)^8 \cdot (2^3)^6}{(2^4)^4 \cdot 3^{17}} = \frac{3^{16} \cdot 2^{18}}{2^{16} \cdot 3^{17}} = \frac{3^{16} \cdot 2^{18}}{2^{16} \cdot 3^{16} \cdot 3} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$$

Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết: $0,5 + \left| x + \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{-3}{\sqrt{16}} \right|$

$$0,5 + \left| x + \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{-3}{\sqrt{16}} \right|$$

$$\frac{1}{2} + \left| x + \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{-3}{4} \right|$$

$$\frac{1}{2} + \left| x + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{4}$$

$$\left| x + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\left| x + \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ hoặc } x + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \text{ hoặc } x = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x = -\frac{1}{4} \text{ hoặc } x = -\frac{3}{4}$$

$$\text{Vậy } x = -\frac{1}{4} \text{ hoặc } x = -\frac{3}{4}$$

Bài 3. (1,0 điểm) Biết rằng $\frac{x+y}{t+z} = \frac{4}{7}$ và $7y = 4z$. Tìm tỉ số $\frac{x}{t}$

Lời giải

$$\text{Ta có: } 7y = 4z \Rightarrow \frac{y}{z} = \frac{4}{7}$$

$$\text{Và } \frac{x+y}{t+z} = \frac{4}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y}{t+z} = \frac{y}{z} = \frac{4}{7}$$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x+y}{t+z} = \frac{y}{z} = \frac{4}{7} = \frac{x+y-y}{t+z-z} = \frac{x}{t}$$

$$\text{Vậy } \frac{x}{t} = \frac{4}{7}$$

Bài 4. (2,0 điểm)

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I.

Lời giải

Gọi giá tiền của 1 mét vải loại I là x ($x > 0$)

Khi đó, giá tiền của 1 mét vải loại II là: $85\%.x$

Với cùng số tiền, giá tiền 1 mét vải và số mét vải mua được là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:


$$51x = 85\%.x.k \text{ (với } k \text{ là số mét vải loại II mua được)}$$

$$\Rightarrow k = \frac{51x}{85\%.x} = 60(m)$$


Vậy với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I, có thể mua được 60 mét vải loại II.

Bài 5 . (0,5 điểm)

Hai đường thẳng AB, CD cắt nhau ở ngoài phạm vi của tờ giấy (xem hình bên). Làm thế nào để biết được góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng ấy?



Lời giải



Từ A kẻ tia $Ax \parallel CD$

Khi đó: $\widehat{BAx} = \widehat{BOC}$ (Hai góc so le trong, $Ax \parallel CD$)

Vậy góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng AB, CD có số đo bằng số đo của $\widehat{BAx}$


Bài 6. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A . Tia phân giác của $\widehat{ABC}$ cắt cạnh AC tại D . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho $BE = BA$

- a) Chứng minh rằng: $\triangle BDA = \triangle BDE$ và $DE \perp BE$
- b) Tia BA cắt tia ED tại F . Chứng minh rằng: $\triangle ADF = \triangle EDC$
- c) Gọi H là giao điểm của tia BD và đoạn thẳng CF . Vẽ EK vuông góc với CF tại K . Chứng minh rằng: $BH \parallel EK$

Lời giải

- a) Chứng minh rằng: $\triangle BDA = \triangle BDE$ và $DE \perp BE$



Xét $\triangle BDA$ và $\triangle BDE$ có:

$$AB = BE(gt)$$

$$\widehat{ABD} = \widehat{EBD}(gt)$$

BD là cạnh chung


Do đó: $\triangle BDA = \triangle BDE(c.g.c)$

$$\Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{BED} \text{ (Hai góc tương ứng)}$$

$$\text{Mà } \widehat{BAD} = 90^0(gt) \Rightarrow \widehat{BED} = 90^0$$

$$\Rightarrow DE \perp BE$$

b) Tia BA cắt tia ED tại F . Chứng minh rằng: $\triangle ADF = \triangle EDC$



Xét $\triangle ADF$ và $\triangle EDC$ có:


$$\widehat{DAF} = \widehat{DEC} = 90^0$$

$$AD = DE \text{ (vì } \triangle BDA = \triangle BDE(c.g.c))$$

$$\widehat{ADF} = \widehat{EDC} \text{ (Hai góc đối đỉnh)}$$

Do đó: $\triangle ADF = \triangle EDC(g.c.g)$

c) Chứng minh rằng: $BH \parallel EK$



Ta có: $AF = EC$ (vì $\triangle ADF = \triangle EDC(g.c.g)$) và $AB = BE(gt)$

$\Rightarrow AB + AF = BE + EC$ hay $BF = BC$

Xét $\triangle BHF$ và $\triangle BHC$ có:

$$BF = BC(cmt)$$

$$\widehat{HBF} = \widehat{HBC}(gt)$$

BH là cạnh chung

Do đó: $\triangle BHF = \triangle BHC(c.g.c)$

$\Rightarrow \widehat{BHF} = \widehat{BHC}$ (Hai góc tương ứng)

Mà $\widehat{BHF} + \widehat{BHC} = 180^0$ (Hai góc kề bù)

$\Rightarrow \widehat{BHF} = \widehat{BHC} = 90^0 \Rightarrow BH \perp CF$

$\left. \begin{array}{l} BH \perp CF \\ EK \perp CF \end{array} \right\} \Rightarrow BH \parallel EK$

Bài 1 (6,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$.

2) Tìm x biết: $\left| \frac{5}{3} - x \right| - \left| \frac{-5}{6} \right| = \left| \frac{-5}{9} \right|$

3) Tìm số nguyên x biết: $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left| x - \frac{2}{3} \right| < \frac{26}{\sqrt{81}}$.

Bài 2 (3,0 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi x_1 và x_2 là hai giá trị của x; y_1 và y_2 là hai giá trị tương ứng của y.

a) Tính x_1 và y_1 biết $2x_1 = 5y_1$ và $2x_1 - 3y_1 = 12$.

b) Tính y_1 biết $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$.

Bài 3 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$. Kẻ AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Lấy điểm D trên AC sao cho $AD = AB$. Kẻ DE và DK lần lượt vuông góc với BC và AH ($E \in BC, K \in AH$).

a) So sánh độ dài BH và AK.

b) Tính số đo góc HAE.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 15^\circ$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, D sao cho $BA = AM = MD$. Kẻ DE vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh rằng $\triangle AME$ đều.

b) Chứng minh rằng $EC = ED$.

Bài 5 (3,0 điểm) Cặp số $(x; y)$ nào thỏa mãn đẳng thức sau: $3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$.

.....**HẾT**.....



Họ và tên thí sinh.....

Chữ ký giám thị 1:.....

Số báo danh:.....

Chữ ký giám thị 2:.....

Bài	ý	Nội dung	Điểm
1 (6đ)	1) (2đ)	$A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$ $= \frac{\frac{3}{8} - \frac{3}{10} + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-\frac{5}{8} + \frac{5}{10} - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{3} - \frac{3}{4}}{\frac{5}{2} + \frac{5}{3} - \frac{1}{4}}$	1,0
		$A = \frac{3(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})}{-5(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})} + \frac{3(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}{5(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}$	0,5
		$A = \frac{-3}{5} + \frac{3}{5} = 0$	0,5
	2) (2đ)	a) $\left \frac{5}{3} - x \right - \left \frac{-5}{6} \right = \left \frac{-5}{9} \right \Leftrightarrow \left \frac{5}{3} - x \right = \frac{5}{9} + \frac{5}{6}$	0,5
		$\left \frac{5}{3} - x \right = \frac{25}{18}$	0,5
		v/h1: $\frac{5}{3} - x = \frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{5}{18}$	0,5
		v/h2: $\frac{5}{3} - x = -\frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{55}{18}$	0,5
		Vậy $x = \frac{5}{18}; x = \frac{55}{18}$.	
	3) (2đ)	Với $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left x - \frac{2}{3} \right \Leftrightarrow \left x - \frac{2}{3} \right > \frac{7}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{2}{3} > \frac{7}{6} \\ x - \frac{2}{3} < -\frac{7}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{11}{6} \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
		Với $\left x - \frac{2}{3} \right < \frac{26}{\sqrt{81}} \Leftrightarrow -\frac{26}{9} < x - \frac{2}{3} < \frac{26}{9} \Leftrightarrow -\frac{29}{9} < x < \frac{32}{9}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$	0,5
		Vậy $x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
2 (3đ)		a, Vì $2x_1 = 5y_1 \Rightarrow \frac{x_1}{5} = \frac{y_1}{2} \Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6}$	0,5

		$\Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6} = \frac{2x_1 - 3y_1}{10 - 6} = \frac{12}{4} = 3$	0,5
		$\Rightarrow x_1 = 15; y_1 = 6$	0,5
		b, Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$	0,5
		Mà $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$ nên: $2x_2 \cdot y_1 = x_2 \cdot 10$	0,5
		Tính được: $y_1 = \frac{10x_2}{2x_2} = 5$	0,5
3 (4d)			
	a) (2d)	a) Chứng minh $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (vì cùng phụ với $\widehat{KAD}$) Xét $\triangle ABH$ và $\triangle DAK$ có: $\widehat{AHB} = \widehat{DKA} = 90^\circ$ $BA = DA$ (gt) $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle ABH = \triangle DAK$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $BH = AK$ (hai cạnh tương ứng)	0,5
	b) (2d)	b) Chứng minh được: $KD \parallel HE \Rightarrow \widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (hai góc so le trong) Xét $\triangle KDH$ và $\triangle EHD$ có: $\widehat{DKH} = \widehat{HED} = 90^\circ$ DH chung $\widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle KDH = \triangle EHD$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $KD = EH$ (hai cạnh tương ứng) Mà $HA = KD$ ($\triangle ABH = \triangle DAK$); Suy ra $HE = HA \Rightarrow \triangle AHE$ vuông cân tại H. Từ đó tính được $\widehat{HAE} = 45^\circ$	1,0 0,5
4 (4d)			
		$\triangle ABC$ có $\widehat{DAC} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB}$ (tính chất góc ngoài tam giác) $\Rightarrow \widehat{DAC} = 60^\circ$ (1)	0,5

	a) (2,0đ)	Lấy điểm F thuộc tia đối của tia ME sao cho: $MF = ME$ Chứng minh được $\triangle AMF = \triangle DME$ (c.g.c) $\Rightarrow \begin{cases} AF = DE \\ \widehat{AFM} = \widehat{DEM} \end{cases}$	0,5
		Vì $\widehat{AFM} = \widehat{DEM}$ (cmt) $\Rightarrow AF \parallel DE$ Vì $AF \parallel DE$ (cmt), mà $DE \perp AC$ (gt) $\Rightarrow AF \perp AC \Rightarrow \widehat{FAE} = 90^\circ$ Chứng minh được $\triangle AFE = \triangle EDA$ (c.g.c)	0,5
		$\Rightarrow EF = AD \Rightarrow ME = MA \Rightarrow \triangle AME$ cân tại M (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow \triangle AME$ đều	0,5
	b) (2,0đ)	Nối E với B Ta có $\triangle AME$ đều (theo câu a) $\Rightarrow AM = AE$; mà $AM = AB$ (gt) Từ đó ta có: $AB = AE \Rightarrow \triangle ABE$ cân tại A $\widehat{BAC} = 180^\circ - (45^\circ + 15^\circ) = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ABE} = \widehat{AEB} = 30^\circ$	0,5
		$\triangle ADE$ vuông tại E, $\widehat{DAC} = 60^\circ$ (theo câu a) $\Rightarrow \widehat{ADE} = 30^\circ$ $\triangle BED$ có: $\widehat{DBE} = \widehat{BDE} (= 30^\circ) \Rightarrow \triangle BED$ cân tại E $\Rightarrow ED = EB$ (3)	0,5
		Ta có: $\widehat{EBC} = \widehat{ABC} - \widehat{ABE} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ \Rightarrow \triangle BEC$ cân tại E $\Rightarrow EB = EC$ (4)	0,5
		Từ (3) và (4) $\Rightarrow EC = ED$	0,5
5 (3đ)		$3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 7^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^{x+2} \cdot 7^x$	1,0
		$\Leftrightarrow \frac{3^{2x+1}}{3^{x+2}} = \frac{7^x}{7^y}$ $\Leftrightarrow 3^{x-1} = 7^{x-y}$	1,0
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ x-y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$	1,0
		Kết luận.	

Lưu ý: - Các cách giải khác với đáp án mà đúng thì cho điểm tương đương
- Điểm toàn bài giữ nguyên không làm tròn.

Bài 1 (6,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$.

2) Tìm x biết: $\left| \frac{5}{3} - x \right| - \left| \frac{-5}{6} \right| = \left| \frac{-5}{9} \right|$

3) Tìm số nguyên x biết: $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left| x - \frac{2}{3} \right| < \frac{26}{\sqrt{81}}$.

Bài 2 (3,0 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi x_1 và x_2 là hai giá trị của x; y_1 và y_2 là hai giá trị tương ứng của y.

a) Tính x_1 và y_1 biết $2x_1 = 5y_1$ và $2x_1 - 3y_1 = 12$.

b) Tính y_1 biết $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$.

Bài 3 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$. Kẻ AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Lấy điểm D trên AC sao cho $AD = AB$. Kẻ DE và DK lần lượt vuông góc với BC và AH ($E \in BC, K \in AH$).

a) So sánh độ dài BH và AK.

b) Tính số đo góc HAE.

Bài 4 (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 15^\circ$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, D sao cho $BA = AM = MD$. Kẻ DE vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh rằng $\triangle AME$ đều.

b) Chứng minh rằng $EC = ED$.

Bài 5 (3,0 điểm) Cặp số $(x; y)$ nào thỏa mãn đẳng thức sau: $3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$.

.....**HẾT**.....



Họ và tên thí sinh.....

Chữ ký giám thị 1:.....

Số báo danh:.....

Chữ ký giám thị 2:.....

Bài	ý	Nội dung	Điểm
1 (6đ)	1) (2đ)	$A = \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$ $= \frac{\frac{3}{8} - \frac{3}{10} + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-\frac{5}{8} + \frac{5}{10} - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{3} - \frac{3}{4}}{\frac{5}{2} + \frac{5}{3} - \frac{5}{4}}$	1,0
		$A = \frac{3(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})}{-5(\frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12})} + \frac{3(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}{5(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4})}$	0,5
		$A = \frac{-3}{5} + \frac{3}{5} = 0$	0,5
	2) (2đ)	a) $\left \frac{5}{3} - x \right - \left \frac{-5}{6} \right = \left \frac{-5}{9} \right \Leftrightarrow \left \frac{5}{3} - x \right = \frac{5}{9} + \frac{5}{6}$	0,5
		$\left \frac{5}{3} - x \right = \frac{25}{18}$	0,5
		v/h1: $\frac{5}{3} - x = \frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{5}{18}$	0,5
		v/h2: $\frac{5}{3} - x = -\frac{25}{18} \Leftrightarrow x = \frac{55}{18}$	0,5
		Vậy $x = \frac{5}{18}; x = \frac{55}{18}$.	
	3) (2đ)	Với $\frac{\sqrt{49}}{6} < \left x - \frac{2}{3} \right \Leftrightarrow \left x - \frac{2}{3} \right > \frac{7}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{2}{3} > \frac{7}{6} \\ x - \frac{2}{3} < -\frac{7}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{11}{6} \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
		Với $\left x - \frac{2}{3} \right < \frac{26}{\sqrt{81}} \Leftrightarrow -\frac{26}{9} < x - \frac{2}{3} < \frac{26}{9} \Leftrightarrow -\frac{29}{9} < x < \frac{32}{9}$	0,5
		Mà $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$	0,5
		Vậy $x \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$	0,5
2 (3đ)		a, Vì $2x_1 = 5y_1 \Rightarrow \frac{x_1}{5} = \frac{y_1}{2} \Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6}$	0,5

		$\Rightarrow \frac{2x_1}{10} = \frac{3y_1}{6} = \frac{2x_1 - 3y_1}{10 - 6} = \frac{12}{4} = 3$	0,5
		$\Rightarrow x_1 = 15; y_1 = 6$	0,5
		b, Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$	0,5
		Mà $x_1 = 2x_2$ và $y_2 = 10$ nên: $2x_2 \cdot y_1 = x_2 \cdot 10$	0,5
		Tính được: $y_1 = \frac{10x_2}{2x_2} = 5$	0,5
3 (4d)			
	a) (2d)	a) Chứng minh $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (vì cùng phụ với $\widehat{KAD}$) Xét $\triangle ABH$ và $\triangle DAK$ có: $\widehat{AHB} = \widehat{DKA} = 90^\circ$ $BA = DA$ (gt) $\widehat{BAH} = \widehat{ADK}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle ABH = \triangle DAK$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $BH = AK$ (hai cạnh tương ứng)	0,5
	b) (2d)	b) Chứng minh được: $KD \parallel HE \Rightarrow \widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (hai góc so le trong) Xét $\triangle KDH$ và $\triangle EHD$ có: $\widehat{DKH} = \widehat{HED} = 90^\circ$ DH chung $\widehat{KDH} = \widehat{EHD}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle KDH = \triangle EHD$ (t/h cạnh huyền - góc nhọn) Suy ra $KD = EH$ (hai cạnh tương ứng) Mà $HA = KD$ ($\triangle ABH = \triangle DAK$); Suy ra $HE = HA \Rightarrow \triangle AHE$ vuông cân tại H. Từ đó tính được $\widehat{HAE} = 45^\circ$	1,0 0,5
4 (4d)			
		$\triangle ABC$ có $\widehat{DAC} = \widehat{ABC} + \widehat{ACB}$ (tính chất góc ngoài tam giác) $\Rightarrow \widehat{DAC} = 60^\circ$ (1)	0,5

5 (3đ)	a) (2,0đ)	Lấy điểm F thuộc tia đối của tia ME sao cho: $MF = ME$ Chứng minh được $\triangle AMF = \triangle DME$ (c.g.c) $\Rightarrow \begin{cases} AF = DE \\ \widehat{AFM} = \widehat{DEM} \end{cases}$	0,5
		Vì $\widehat{AFM} = \widehat{DEM}$ (cmt) $\Rightarrow AF \parallel DE$ Vì $AF \parallel DE$ (cmt), mà $DE \perp AC$ (gt) $\Rightarrow AF \perp AC \Rightarrow \widehat{FAE} = 90^\circ$ Chứng minh được $\triangle AFE = \triangle EDA$ (c.g.c)	0,5
		$\Rightarrow EF = AD \Rightarrow ME = MA \Rightarrow \triangle AME$ cân tại M (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow \triangle AME$ đều	0,5
	b) (2,0đ)	Nối E với B Ta có $\triangle AME$ đều (theo câu a) $\Rightarrow AM = AE$; mà $AM = AB$ (gt) Từ đó ta có: $AB = AE \Rightarrow \triangle ABE$ cân tại A $\widehat{BAC} = 180^\circ - (45^\circ + 15^\circ) = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ABE} = \widehat{AEB} = 30^\circ$	0,5
		$\triangle ADE$ vuông tại E, $\widehat{DAC} = 60^\circ$ (theo câu a) $\Rightarrow \widehat{ADE} = 30^\circ$ $\triangle BED$ có: $\widehat{DBE} = \widehat{BDE} (= 30^\circ) \Rightarrow \triangle BED$ cân tại E $\Rightarrow ED = EB$ (3)	0,5
		Ta có: $\widehat{EBC} = \widehat{ABC} - \widehat{ABE} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ \Rightarrow \triangle BEC$ cân tại E $\Rightarrow EB = EC$ (4)	0,5
		Từ (3) và (4) $\Rightarrow EC = ED$	0,5
		$3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 7^x$ $\Leftrightarrow 3^{2x+1} \cdot 7^y = 3^{x+2} \cdot 7^x$	1,0
		$\Leftrightarrow \frac{3^{2x+1}}{3^{x+2}} = \frac{7^x}{7^y}$ $\Leftrightarrow 3^{x-1} = 7^{x-y}$	1,0
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ x-y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ Kết luận.	1,0

Lưu ý: - Các cách giải khác với đáp án mà đúng thì cho điểm tương đương
- Điểm toàn bài giữ nguyên không làm tròn.

Môn thi: TOÁN

Ngày thi: 19/1/2019

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (4 điểm) Tìm x, biết:

$$a) \frac{11}{13} - \left(\frac{5}{42} - x \right) = - \left(\frac{15}{28} - \frac{11}{13} \right)$$

$$b) \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{5}{12} \cdots \frac{30}{62} \cdot \frac{31}{64} = 2^x$$

Bài 2: (4 điểm) Thực hiện phép tính:

$$A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11}$$

$$B = \frac{3 + 0,75 - \frac{3}{19}}{\frac{5}{2} + 0,625 - \frac{5}{38}} \cdot \frac{15 + \frac{15}{17} - \frac{15}{144} + \frac{15}{34}}{2 + \frac{3}{17} - \frac{2}{144}} + 2018$$

Bài 3: (4 điểm)

a) Cho $(x_1a - y_1b)^{2n} + (x_2a - y_2b)^{2n} + (x_3a - y_3b)^{2n} + \dots + (x_ma - y_mb)^{2n} \leq 0$

(với $m, n \in \mathbb{N}^*$). Chứng minh: $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_m}{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_m} = \frac{b}{a}$

b) Cho 3 số x, y, z là 3 số khác 0 thỏa mãn điều kiện:

$$\frac{y+z-x}{x} = \frac{z+x-y}{y} = \frac{x+y-z}{z}$$

Hãy tính giá trị biểu thức: $B = \left(1 + \frac{x}{y} \right) \left(1 + \frac{y}{z} \right) \left(1 + \frac{z}{x} \right)$.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC ($AB > AC$), M là trung điểm của BC. Đường thẳng đi qua M vuông góc với tia phân giác của góc A tại H cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E và F.

Chứng minh:

a) $EH = HF$

b) $2\widehat{BME} = \widehat{ACB} - \widehat{B}$.

c) $\frac{FE^2}{4} + AH^2 = AE^2$.

d) $BE = CF$.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

===== HẾT =====

Họ tên học sinh: SBD: Phòng thi số:

Chú ý: Thí sinh dự thi không được sử dụng máy tính cầm tay!

Đề thi KSCL học sinh giỏi lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT thành phố Vinh năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ VINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Nó thi gồm có 01 trang)

KỶ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn khảo sát: Toán 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (4.0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a. $\left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11}\right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11}\right) : \frac{7}{11}$

b. $\frac{2^{10} \cdot 3^7 - 4^5 \cdot 9^2}{(2^5 \cdot 3)^2 + 8^4 \cdot 3^2} - \frac{5^6 \cdot 7^2 - 25^3 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^2 + 5^5 \cdot 14^2}$

Câu 2. (4.0 điểm) Tìm x, y biết:

a. $\left|x - \frac{1}{3}\right| + \frac{4}{5} = \left|(-3.2) + \frac{2}{5}\right|$

b. $5^x + 5^{x+2} = 650$

c. $\frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{3x} = \frac{1+7y}{4x}$

Câu 3. (3.0 điểm)

a. Tìm $n \in \mathbb{Z}, n \neq 7$ để biểu thức $\frac{n+3}{n-7}$ đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

b. Cuối năm công ty A thưởng 45 triệu đồng cho 3 tổ lao động xuất sắc. Biết rằng số tiền thưởng của tổ 2 và tổ 3 tỷ lệ nghịch với $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{2}$, số tiền thưởng của tổ 1 và tổ 3 tỷ lệ thuận với 5 và 4. Tính số tiền thưởng mỗi tổ.

Câu 4. (7.0 điểm)

Cho tam giác ABC . Về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ABE vuông cân tại B . Kẻ AH vuông góc với BC . Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho $AI = BC$.

a. Chứng minh rằng: $BI = EC$ và $BI \perp CE$

b. Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD . Giả sử $AB = 2\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$ và $AM = \sqrt{3}\text{ cm}$. Tính độ dài đoạn DC và số đo $\widehat{BAC}$.

Câu 5. (2.0 điểm)

Cho x, y, z, t là các số tự nhiên khác 0.


Hỏi biểu thức $M = \frac{x+t}{x+y+z+t} + \frac{y+z}{y+z+t} + \frac{z+t}{z+t+x} + \frac{t+x}{t+x+y}$ có thể nhận giá trị là số tự nhiên hay không?

————— Hết —————

Đáp án học sinh giỏi lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT thành phố Vinh năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊNH PHỐ VINH		KỶ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018 - 2019	
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM – Môn Toán 7			
Câu	Nội dung	Điểm	
1			
a, 2.0đ	$\left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11}\right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11}\right) : \frac{7}{11} = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11}\right) \cdot \frac{11}{7} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11}\right) \cdot \frac{11}{7}$	1.0	
	$= \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} + \frac{-4}{7} + \frac{7}{11}\right) \cdot \frac{11}{7} = \left(\frac{-3}{7} + \frac{-4}{7}\right) + \left(\frac{4}{11} + \frac{7}{11}\right) \cdot \frac{11}{7}$	0.5	
	$= (-1+1) \cdot \frac{11}{7} = 0 \cdot \frac{11}{7} = 0$	0.5	
b, 2.0 đ	$\frac{2^{12} \cdot 3^3 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3} = \frac{2^{12} \cdot 3^3 - 2^{12} \cdot 3^4}{2^{12} \cdot 3^6 + 2^{12} \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 5^{10} \cdot 7^4}{5^9 \cdot 7^3 + 5^9 \cdot 2^3 \cdot 7^3}$	1.0	
	$= \frac{2^{12} \cdot 3^3 \cdot (3-1)}{2^{12} \cdot 3^5 \cdot (3+1)} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 \cdot (1-7)}{5^9 \cdot 7^3 \cdot (1+8)}$	0.5	
	$= \frac{2}{3 \cdot 4} - \frac{5 \cdot (-6)}{9} = \frac{1}{6} + \frac{10}{3} = \frac{1}{6} + \frac{20}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$	0.5	
2			
a, 1.5 đ	$\left x - \frac{1}{3}\right + \frac{4}{5} = \left (-3 \cdot 2) + \frac{2}{5}\right $	0.25	
	$\Leftrightarrow \left x - \frac{1}{3}\right + \frac{4}{5} = \left -6 + \frac{2}{5}\right $	0.5	
	$\Leftrightarrow \left x - \frac{1}{3}\right + \frac{4}{5} = \frac{28}{5}$	0.25	
	$\Leftrightarrow \left x - \frac{1}{3}\right = \frac{28}{5} - \frac{4}{5}$		
	$\Leftrightarrow \left x - \frac{1}{3}\right = \frac{24}{5}$		
	$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{3} = \frac{24}{5} \\ x - \frac{1}{3} = -\frac{24}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{77}{15} \\ x = -\frac{67}{15} \end{cases}$ Vậy $x \in \left\{\frac{77}{15}; -\frac{67}{15}\right\}$	0.5	
b, 1.5đ	$5^x + 5^{x+2} = 650 \Leftrightarrow 5^x + 5^x \cdot 5^2 = 650$	0.25	
	$\Leftrightarrow 5^x(1+5^2) = 650$	0.5	
	$\Leftrightarrow 5^x \cdot 26 = 650$	0.25	
	$\Leftrightarrow 5^x = 25$	0.25	
	$\Leftrightarrow 5^x = 5^2$	0.25	
	$\Leftrightarrow x = 2$. Vậy $x = 2$	0.25	
c, 1.0đ	Ta có: $\frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{5x} = \frac{5+15y}{60} = \frac{3+15y}{15x} = \frac{2}{60-15x} = \frac{4}{120-30x}$	0.25	
	$\frac{1+3y}{12} = \frac{1+7y}{4x} = \frac{7+21y}{84} = \frac{3+21y}{12x} = \frac{4}{84-12x}$	0.25	
	Nên $\frac{4}{120-30x} = \frac{4}{84-12x} \Leftrightarrow 120-30x = 84-12x$	0.25	

	$\Leftrightarrow 36 = 18x \Leftrightarrow x = 2$	0.25
	Thay vào ta được: $\frac{1+3y}{12} = \frac{4}{84-12 \cdot 2} = \frac{1}{15}$	
	$\Leftrightarrow 15 + 45y = 12 \Leftrightarrow 45y = -3 \Leftrightarrow y = \frac{-1}{15}$	
	Với $x = 2$ và $y = \frac{-1}{15}$ thỏa mãn bài ra	
3		0.25
a,	Ta có: $\frac{n+3}{n-7} = \frac{n-7+10}{n-7} = 1 + \frac{10}{n-7}$	
1.25 đ	$\Rightarrow \frac{n+3}{n-7}$ lớn nhất $\Leftrightarrow \frac{10}{n-7}$ lớn nhất	0.25
	TH1: $n-7 < 0 \Leftrightarrow \frac{10}{n-7} < 0$	
	TH2: $n-7 > 0 \Leftrightarrow \frac{10}{n-7} > 0$	0.5
	$\Rightarrow \frac{10}{n-7}$ lớn nhất $\Leftrightarrow n-7 > 0$; $n-7 \in \mathbb{Z}$ và $n-7$ nhỏ nhất	
	$\Leftrightarrow n-7 = 1 \Leftrightarrow n = 8$ (thỏa mãn)	0.25
	Vậy $\frac{n+3}{n-7}$ đạt giá trị lớn nhất khi $n=8$, khi đó giá trị lớn nhất là: $\frac{8+3}{8-7} = 11$	0.25
b,	Gọi số tiền thưởng của tổ 1, tổ 2, tổ 3 được nhận lần lượt là x, y, z (triệu đồng) ($x, y, z > 0$)	
1.75 đ	Theo bài ra y và z tỷ lệ nghịch với $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot y = \frac{1}{2} \cdot z \Leftrightarrow \frac{y}{3} = \frac{z}{2} \Leftrightarrow \frac{y}{6} = \frac{z}{4}$	0.5
	Theo bài ra x và z tỷ lệ thuận với 5 và 4 $\Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{z}{4}$	0.25
	$\Rightarrow \frac{y}{6} = \frac{z}{4} = \frac{x}{5}$	0.25
	Mà $x + y + z = 45 \Rightarrow \frac{y}{6} = \frac{z}{4} = \frac{x}{5} = \frac{x+y+z}{5+4+6} = \frac{45}{15} = 3$	0.25
	$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{5} = 3 \Rightarrow x = 15 \\ \frac{y}{6} = 3 \Rightarrow y = 18 \\ \frac{z}{4} = 3 \Rightarrow z = 12 \end{cases}$	0.25
	Vậy Số tiền thưởng của tổ 1 là: 15 triệu đồng Số tiền thưởng của tổ 2 là: 18 triệu đồng Số tiền thưởng của tổ 3 là: 12 triệu đồng	



3.0 đ	a,	Ta có: $\widehat{FAB} = \widehat{AHB} + \widehat{ABC} = 90^\circ + \widehat{ABC}$	0.5
		Lại có: $\widehat{EBC} = \widehat{EBA} + \widehat{ABC} = 90^\circ + \widehat{ABC}$	0.5
		$\Rightarrow \widehat{FAB} = \widehat{EBC}$	
		Xét $\triangle EBC$ và $\triangle BAI$ ta có:	0.75
		$\widehat{EBC} = \widehat{FAB}$ (chứng minh trên)	
		$EB = BA$ (Vì $\triangle ABE$ vuông cân tại B)	
		$BC = AI$ (Giả thiết)	
4.0 đ	b,	$\Rightarrow \triangle EBC = \triangle BAI$ (c-g-c)	
		$\Rightarrow EC = BI$ và $\widehat{BEC} = \widehat{ABI}$	0.5
		Vì $\widehat{ABI} + \widehat{IBE} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{BEC} + \widehat{IBE} = 90^\circ \Rightarrow BI \perp EC$	0.75
4.0 đ		Xét $\triangle ABM$ và $\triangle DMC$ có:	1.0
		$AM = MD$ (gt)	
		$MB = MC$ (gt)	
		$\widehat{AMB} = \widehat{CMD}$ (dd)	
		Suy ra $\triangle ABM = \triangle DMC$ (c-g-c)	
		$CD = AB = 2\text{cm}$	0.5
		Suy ra $AD = 2\sqrt{3}\text{ cm}$, $CD = 2\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$ suy ra tam giác ADC vuông tại D (AD định lý Pitago đảo) nên $\widehat{BAM} = \widehat{CDM} = 90^\circ$	0.5
		Gọi N là trung điểm của AC , trên tia đối của tia ND lấy F sao cho N là trung điểm của FD .	0.5

	Xét $\square ANF$ và $\square CND$ có: AN = NC (gt) NF = ND (gt) $\widehat{ANF} = \widehat{END}$ (đd) Suy ra $\square ANF = \square CND$ (c-g-c)	0.25
	Nên AF = CD và $\widehat{AFN} = \widehat{NCD} \Rightarrow AF \parallel CD \Rightarrow AF$ vuông góc với AD	0.25
	Suy ra $\square FAD = \square CDA$ (c-g-c) $\Rightarrow AC = FD \Rightarrow DN = \frac{1}{2} CD = 2$ cm	0.25
	$\Rightarrow DN = NC = CD \Rightarrow$ tam giác CND đều	0.25
	$\Rightarrow \widehat{NCD} = 60^\circ$; mà $\widehat{EDA} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{EAD} = 30^\circ$	0.25
	$\Rightarrow \widehat{BAC} = 120^\circ$	0.25
	Lưu ý: Hs sử dụng t/c trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông bằng nửa cạnh ấy thì cho $\frac{1}{2}$ số điểm phần này	
5	Ta có: $x, y, z, t \in \mathbb{N}^*$	0.75
2.0 đ	$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{x+y+z} > \frac{x}{x+y+z+t} \\ \frac{y}{y+z+t} > \frac{y}{x+y+z+t} \\ \frac{z}{z+t+x} > \frac{z}{x+y+z+t} \\ \frac{t}{t+x+y} > \frac{t}{x+y+z+t} \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{x+y+z} + \frac{y}{y+z+t} + \frac{z}{z+t+x} + \frac{t}{t+x+y} > \frac{x+y+z+t}{x+y+z+t} = 1$	
	$\Rightarrow M > 1$ (1)	
	Mặt khác: với $\frac{a}{b} < 1$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$) ta có: $\frac{a}{b} < \frac{a+n}{b+n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	0.5
	Thật vậy: $a(b+n) = ab + an$, $b(a+n) = ab + bn$	
	Mà $\frac{a}{b} < 1 \Rightarrow a < b$ (do $a, b \in \mathbb{N}^*$) $\Rightarrow an < bn$ (do $n \in \mathbb{N}^*$)	
	$\Rightarrow a(b+n) < b(a+n) \Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+n}{b+n}$	
	Áp dụng bất đẳng thức trên ta có:	0.5
	$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{x+y+z} < \frac{x+t}{x+y+z+t} \\ \frac{y}{y+z+t} < \frac{y+x}{x+y+z+t} \\ \frac{z}{z+t+x} < \frac{z+y}{x+y+z+t} \\ \frac{t}{t+x+y} < \frac{t+z}{x+y+z+t} \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{x+y+z} + \frac{y}{y+z+t} + \frac{z}{z+t+x} + \frac{t}{t+x+y} < \frac{2(x+y+z+t)}{x+y+z+t} = 2$	
	$\Rightarrow M < 2$ (2)	
	Từ (1), (2) $\Rightarrow 1 < M < 2 \Rightarrow M$ không thể nhận giá trị là một số tự nhiên.	0.25
	Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa	

Xem tiếp tài liệu tại: <https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7>

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện
Thuận Thành năm học 2018 - 2019

UBND HUYỆN THUẬN THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
CẤP THCS - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán - Lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 27/02/2019

Bài 1: (6 điểm)

Tính:

$$1, A = \left[6 \cdot \left(\frac{-1}{3} \right)^3 - 3 \cdot \left(\frac{-1}{3} \right) + 1 \right] - \left(\frac{-1}{3} - 1 \right)$$

$$2, B = (6^3 + 3 \cdot 6^2 + 3^3) : 13$$

$$3, C = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

Bài 2: (4 điểm)

Tìm các cặp số (x; y) biết:

a. $\frac{x}{3} = \frac{y}{7}$; $xy=84$

b. $\frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{5x} = \frac{1+7y}{4x}$

Bài 3: (3 điểm)

Ba máy xay xay được 359 tấn thóc. Số ngày làm việc của các máy tỉ lệ theo 3:4:5, số giờ làm việc mỗi ngày của các máy tỉ lệ theo 6: 7: 8 còn công suất các máy tỉ lệ nghịch với 5,4,3. Hỏi mỗi máy xay được bao nhiêu tấn thóc.

Bài 4: (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), O là trung điểm của BC, trên tia đối của tia OA lấy điểm K sao cho $OA=OK$. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia HC lấy $HD=HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh tam giác ABC và tam giác CKA bằng nhau.

2. Chứng minh $AB=AE$

3. Gọi M là trung điểm của BE. Tính số đo góc CHM

4. Chứng minh $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

Bài 5: (1 điểm)

Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức $A = \frac{14-x}{4-x}$ Có giá trị lớn nhất?

Tìm giá trị đó.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: SBD:

Giám thị 1: Giám thị 2:

**Đáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 7 môn Toán Phòng
GD&ĐT huyện Thuận Thành năm học 2018 - 2019**

UBND HUYỆN THUẬN THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HD CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
CẤP THCS - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán - Lớp 7

Bài 1:

Tính: (mỗi phần đúng cho 2 điểm)

$$1, A = \left[6 \cdot \left(\frac{-1}{3} \right)^3 - 3 \cdot \left(\frac{-1}{3} \right) + 1 \right] - \left(\frac{-1}{3} - 1 \right)$$

$$2, B = (6^3 + 3 \cdot 6^2 + 3^3) : 13$$

$$3, C = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

HD

1. Thực hiện theo từng bước đúng kết quả cho điểm tối đa $\frac{2,8}{3}$
 2. $B = (6^3 + 3 \cdot 6^2 + 3^3) : 13 = 3^3 (2^3 + 2^2 + 1) : 13 = 13 \cdot 3^3 : 13 = 3^3$

$$\begin{aligned} C &= \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3} = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 2^{12} \cdot 3^4}{2^{12} \cdot 3^6 + 2^{12} \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 5^{10} \cdot 7^4}{5^9 \cdot 7^3 + 5^9 \cdot 2^3 \cdot 7^3} \\ &= \frac{2^{12} \cdot 3^4 \cdot (3-1)}{2^{12} \cdot 3^5 \cdot (3+1)} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 \cdot (1-7)}{5^9 \cdot 7^3 \cdot (1+2^3)} \\ &= \frac{2^{12} \cdot 3^4 \cdot 2}{2^{12} \cdot 3^5 \cdot 4} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 \cdot (-6)}{5^9 \cdot 7^3 \cdot 9} \\ &= \frac{1}{6} - \frac{-10}{3} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Bài 2: (mỗi phần đúng cho 2 điểm)

Tìm các cặp số (x; y) biết:

a. $\frac{x}{3} = \frac{y}{7}; xy = 84$

b. $\frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{5x} = \frac{1+7y}{4x}$

HD

a/ $\frac{x}{3} = \frac{y}{7}; xy = 84 \Rightarrow \frac{x^2}{9} = \frac{y^2}{49} = \frac{xy}{3 \cdot 7} = \frac{84}{21} = 4$ (0.5đ)

$\Rightarrow x^2 = 4 \cdot 9 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$ (0.5đ)

$\Rightarrow y^2 = 4 \cdot 7 = 28 \Rightarrow y = \pm \sqrt{28}$ (0.5đ)

Do x, y cùng dấu nên:

- $x = 6; y = 14$
- $x = -6; y = -14$

(0,5đ)

$$b/ \frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{5x} = \frac{1+7y}{4x}$$

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{1+3y}{12} = \frac{1+5y}{5x} = \frac{1+7y}{4x} \Rightarrow \frac{1+7y-1-5y}{4x-5x} = \frac{2y}{-x} = \frac{1+5y-1-3y}{5x-12} = \frac{2y}{5x-12}$$

$$\Rightarrow \frac{2y}{-x} = \frac{2y}{5x-12}$$

(0,5đ)

$$\Rightarrow -x = 5x - 12 \text{ (vì } y \text{ khác } 0)$$

$$\Rightarrow x = 2. \text{ Thay } x = 2 \text{ vào trên ta được:}$$

(0,5đ)

$$\frac{1+3y}{12} = \frac{2y}{-2} = -y$$

$$\Rightarrow 1+3y = -12y$$

$$\Rightarrow 1 = -15y$$

(0,5đ)

$$\Rightarrow y = \frac{-1}{15}$$

$$\text{Vậy } x = 2, y = \frac{-1}{15} \text{ thỏa mãn đề bài}$$

(0,5đ)

Bài 3:

Ba máy xay xay được 359 tấn thóc. Số ngày làm việc của các máy tỉ lệ theo 3:4:5, số giờ làm việc mỗi ngày của các máy tỉ lệ theo 6: 7: 8 còn công suất các máy tỉ lệ nghịch với 5,4,3. Hỏi mỗi máy xay được bao nhiêu tấn thóc.

HD

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số ngày làm việc của 3 máy

$$\Rightarrow \frac{x_1}{3} = \frac{x_2}{4} = \frac{x_3}{5} \quad (1) \quad (0,5đ)$$

Gọi y_1, y_2, y_3 lần lượt là số giờ làm việc của các máy

$$\Rightarrow \frac{y_1}{6} = \frac{y_2}{7} = \frac{y_3}{8} \quad (2) \quad (0,5đ)$$

Gọi z_1, z_2, z_3 lần lượt là công suất của 3 máy

$$\Rightarrow 5z_1 = 4z_2 = 3z_3 \Leftrightarrow \frac{z_1}{\frac{1}{5}} = \frac{z_2}{\frac{1}{4}} = \frac{z_3}{\frac{1}{3}} \quad (3) \quad (0,5đ)$$

$$\text{Mà } x_1y_1z_1 + x_2y_2z_2 + x_3y_3z_3 = 359 \quad (3) \quad (0,5đ)$$

$$\text{Từ (1) (2) (3)} \Rightarrow \frac{x_1y_1z_1}{\frac{18}{5}} = \frac{x_2y_2z_2}{7} = \frac{x_3y_3z_3}{\frac{40}{3}} = \frac{359}{15} = 15 \quad (0,5đ)$$

$\Rightarrow x_1y_1z_1 = 54; \quad x_2y_2z_2 = 105; \quad x_3y_3z_3 = 200$
 Vậy số thóc mỗi máy lần lượt là 54, 105, 200 (0,5đ)

Cách 2

Gọi số thóc mỗi máy đã xay lần lượt là x, y, z

Suy ra $x+y+z = 359$


Chia 359 thành 3 phần tỷ lệ thuận với 3,4,5 và với 6,7,8 đồng thời tỷ lệ nghịch với 5,4,3 ta suy ra $\frac{x}{18} = \frac{y}{7} = \frac{z}{40} = \frac{x+y+z}{359} = \frac{359}{359} = 1$

Từ đó suy ra x, y, z

Bài 4: (mỗi phần đúng cho 1.5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), O là trung điểm của BC, trên tia đối của tia OA lấy điểm K sao cho $OA = OK$. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia HC lấy $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1. Chứng minh tam giác ABC và tam giác CKA bằng nhau.
2. Chứng minh $AB = AE$.
3. Gọi M là trung điểm của BE. Tính số đo góc CHM
4. Chứng minh $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$



1. Chứng minh tam giác ABC và tam giác CKA bằng nhau.
 - Chỉ ra tam giác AOB = Tam giác KOC (C-G-C) suy ra AB bằng và song song với CK.
 - Suy ra CK vuông góc với AC
 - Suy ra hai tam giác vuông ABC và CKA bằng nhau
 - Suy ra tính chất $OA = OC = OB = OK$.
2. Chứng minh $AB = AE$

- Kẻ EF vuông góc với AH suy ra EF=AH (=HD) 0,5
 - Chỉ ra hai góc ABH và EAF bằng nhau (cùng phụ góc ACB) 0,5
 - Chỉ ra hai tam giác AHB và EFA bằng nhau suy ra AB=AE 0,5

3. Gọi M là trung điểm của BE. Tính số đo góc CHM
 - Sử dụng tính chất suy ra ở câu 1 để suy ra MA=MD=MB=ME 0,5
 - Suy ra hai tam giác MHA và MHD bằng nhau suy ra hai góc AHM và MHD bằng nhau và bằng 45 độ. 0,5 - 0,5

4. Chứng minh $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$
 - Từ công thức tính diện tích tam giác ABC suy ra AH.BC = AB.AC 0,5
 - Bình phương hai vế suy ra AH².BC² = AB².AC² 0,5
 Suy ra $\frac{1}{AH^2} = \frac{BC^2}{AB^2 + AC^2}$
 - Áp dụng định lý pitago trong tam giác ABC ta có AB²+AC²=BC² 0,25
 - Thay vào biến đổi suy ra điều phải chứng minh. 0,25

Bài 5:
 Với giá trị nguyên nào của x thì biểu thức $A = \frac{14-x}{4-x}$ Có giá trị lớn nhất?
 Tìm giá trị đó.

HD

$P = \frac{4-x+10}{4-x} = 1 + \frac{10}{4-x}$ P lớn nhất khi $\frac{10}{4-x}$ lớn nhất 0,25

Xét $x > 4$ thì $\frac{10}{4-x} < 0$ 0,25

Xét $x < 4$ thì $\frac{10}{4-x} > 0$

$\rightarrow \frac{10}{4-x}$ lớn nhất $\rightarrow 4-x$ là số nguyên dương nhỏ nhất 0,25

$\rightarrow 4-x = 1 \rightarrow x = 3$

khi đó $\frac{10}{4-x} = 10 \rightarrow P_{\text{lớn nhất}} = 11.$ 0,25

Xem tiếp tài liệu tại: <https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7>

Đề bài:

Câu 1: (4 điểm). Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \left[\left(2 + 2\frac{1}{3} \right) \cdot 0,75 \right] \left[3\frac{1}{2} - 0,5 : \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right]$

b) $B = \frac{5 \cdot 4^{15} \cdot 9^9 - 4 \cdot 3^{20} \cdot 8^9}{5 \cdot 2^{10} \cdot 6^{19} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 27^6}$

c) $C = \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{3^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{4^2} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{100^2} - 1 \right)$

Câu 2: (4 điểm)

a) Một mảnh đất hình tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là 3(m); 4(m); 6(m) và đường cao tương ứng là h_a (m); h_b (m); h_c (m).

Tính diện tích mảnh đất biết: $h_a - h_b + h_c = 25$ (m).

b) BiÖt $\frac{bz - cy}{a} = \frac{cx - az}{b} = \frac{ay - bx}{c}$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$

c) Tìm x, y nguyên biết: $xy + 3x - y = 6$

Câu 3: (4 điểm)

a. Tìm x, biết: $5^x + 5^{x+2} = 650$

b. Tìm x, biết: $3\frac{1}{2} : \left(4 - \frac{1}{3}|2x + 1| \right) = \frac{21}{22}$

c. Tìm x, y, z biết: $3x = 2y$; $4y = 5z$ và $-x - y + z = -52$.

Câu 4: (6 điểm) Cho ΔABC có góc A nhọn. Phía ngoài ΔABC vẽ ΔBAD vuông cân tại A, ΔCAE vuông cân tại A. Chứng minh:

a/ $DC = BE$; $DC \perp BE$

b/ $BD^2 + CE^2 = BC^2 + DE^2$

c/ Đường thẳng qua A vuông góc với DE cắt BC tại K. Chứng minh K là trung điểm của BC.

Câu 5: (2,0 điểm)

1) Cho ΔABC nhọn với $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Chứng minh rằng:
 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - AB \cdot AC$

2) Cho $m, n \in \mathbb{N}$ và p là số nguyên tố thỏa mãn: $\frac{p}{m-1} = \frac{m+n}{p}$.

Chứng minh rằng: $p^2 = n + 2$.


-Hết-

Họ và tên : Lớp.....SBD.....

Câu	Đáp án	Điểm
1 (4đ)	a) $A = \left[\left(2 + 2\frac{1}{3} \right) \cdot 0,75 \right] \left[3\frac{1}{2} - 0,5 : \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] = \left[\frac{13}{3} \cdot \frac{3}{4} \right] \left[\frac{7}{2} - \frac{1}{2} : \frac{13}{30} \right]$	0,5
	$= \frac{13}{4} \left[\frac{7}{2} - \frac{15}{13} \right]$	0,5
	$= \frac{13}{4} \cdot \frac{61}{26} = \frac{61}{8}$	0,5
	b) $B = \frac{5 \cdot 4^{15} \cdot 9^9 - 4 \cdot 3^{20} \cdot 8^9}{5 \cdot 2^{10} \cdot 6^{19} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 27^6} = \frac{5 \cdot 2^{2 \cdot 15} \cdot 3^{2 \cdot 9} - 2^2 \cdot 3^{20} \cdot 2^{3 \cdot 9}}{5 \cdot 2^{10} \cdot 2^{19} \cdot 3^{19} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{3 \cdot 6}}$	0,5
	$= \frac{2^{29} \cdot 3^{18} (5 \cdot 2 - 3^2)}{2^{29} \cdot 3^{18} (5 \cdot 3 - 7)}$	0,5
	$= \frac{10 - 9}{15 - 7} = \frac{1}{8}$	0,25
2 (4đ)	$C = \left(\frac{1}{2^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{3^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{4^2} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{100^2} - 1 \right)$	
	$= \left(\frac{1-4}{2^2} \right) \left(\frac{1-9}{3^2} \right) \left(\frac{1-16}{4^2} \right) \dots \left(\frac{1-10000}{100^2} \right) = \frac{-3}{2^2} \cdot \frac{-8}{3^2} \cdot \frac{-15}{4^2} \dots \frac{-9999}{100^2}$	0,5
	$= -\frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \dots \frac{99 \cdot 101}{100^2} = -\frac{(1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 99)(3 \cdot 4 \cdot 5 \dots 101)}{(2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 100)(2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 100)}$	0,5
	$= -\frac{1 \cdot 101}{100 \cdot 2} = -\frac{101}{200}$	0,25
	a) Theo bài ra ta có: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot h_b = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot h_c (=S_{ABC})$	0,5
	$S_{ABC} = \frac{3}{2} h_a = 2h_b = 3h_c$	0,25
	$\Leftrightarrow S_{ABC} = \frac{h_a}{\frac{2}{3}} = \frac{h_b}{\frac{1}{2}} = \frac{h_c}{\frac{1}{3}} = \frac{h_a - h_b + h_c}{\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{25}{\frac{1}{2}} = 25 \cdot 2 = 50(m^2)$	0,5
	b) $\frac{bz - cy}{a} = \frac{cx - az}{b} = \frac{ay - bx}{c} = \frac{a(bz - cy)}{a^2} = \frac{b(cx - az)}{b^2} = \frac{c(ay - bx)}{c^2}$	0,5
	$= \frac{abz - acy + bcx - abz + acy - bcx}{a^2 + b^2 + c^2} = 0$	0,5
	Suy ra:	0,5

	$\frac{bz - cy}{a} = 0 \Rightarrow bz = cy \Rightarrow \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ $\frac{cx - az}{b} = 0 \Rightarrow cx = az \Rightarrow \frac{c}{z} = \frac{a}{x}$ $\frac{ay - bx}{c} = 0 \Rightarrow ay = bx \Rightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ Từ (1), (2) và (3) suy ra: $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ c) $x(y + 3) - (y + 3) = 3$ $(x - 1)(y + 3) = 3$ $\begin{cases} x - 1 = \pm 1 \\ y + 3 = \pm 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = \pm 3 \\ y + 3 = \pm 1 \end{cases}$ Các cặp $(x; y)$ là: $(2; 0), (0; -6), (4; -2), (-2; -4)$	0,25 0,25 0,25 0,25
3	a) Ta có: $5^x + 5^{x+2} = 650$ $5^x(1 + 5^2) = 650$ $5^x \cdot 26 = 650$ $5^x = 25 = 5^2$ $x = 2$ b) $3\frac{1}{2} : \left(4 - \frac{1}{3} 2x + 1 \right) = \frac{21}{22}$ $4 - \frac{1}{3} 2x + 1 = \frac{7}{2} : \frac{21}{22}$ $\frac{1}{3} 2x + 1 = 4 - \frac{11}{3}$ $\frac{1}{3} 2x + 1 = \frac{1}{3}$ $2x + 1 = 1$ Suy ra $2x + 1 = -1$ hoặc $2x + 1 = 1$ $x = -1$ hoặc $x = 0$ Vậy $x = -1$ và $x = 0$ c) Từ $3x = 2y \Rightarrow 15x = 10y \Rightarrow \frac{x}{10} = \frac{y}{15}$ từ $4y = 5z \Rightarrow 12y = 15z \Rightarrow \frac{y}{15} = \frac{z}{12}$ $\Rightarrow \frac{x}{10} = \frac{y}{15} = \frac{z}{12} = \frac{-x - y + z}{-10 - 15 + 12} = \frac{-52}{-13} = 4$ $\Rightarrow x = 40; y = 60; z = 48.$	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
4 (6đ)	Hình vẽ	



	a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADC$ (c.g.c) $\Rightarrow DC = BE$ $\Rightarrow \widehat{ABE} = \widehat{ADC}$ mà $BA \perp DA \Rightarrow DC \perp BE$ b) Gọi M là giao điểm của BE và DC Áp dụng định lý Pyta go vào các tam giác vuông MCE, MBD, MDE và BMC ta được : $CE^2 = ME^2 + MC^2$; $DB^2 = MD^2 + MB^2$; $DE^2 = MD^2 + ME^2$; $BC^2 = MB^2 + MC^2$ $\Rightarrow BD^2 + CE^2 = MD^2 + MB^2 + ME^2 + MC^2$; $\Rightarrow BD^2 + CE^2 = BC^2 + DE^2$ c) Trên tia AK lấy điểm P sao cho $AP = DE$ $\widehat{AED} = \widehat{CAP}$ (góc có cạnh tương ứng vuông góc) $AE = AC$ (gt) $\Rightarrow \triangle ADE = \triangle CPA$ (c.g.c) $\Rightarrow CP = AD \Rightarrow CP = AB$ $\widehat{P} = \widehat{BAK}$ (cùng bằng $\widehat{ADE}$) $\Rightarrow CP \parallel AB \Rightarrow \widehat{B} = \widehat{PCK}$ (so le trong) $\Rightarrow \triangle CPK = \triangle BAK$ (g.c.g) $\Rightarrow BK = KC \Rightarrow đpcm$	0,75 0,5 0,75 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5
5 (2đ)	Hình vẽ  Kẻ $BH \perp AC$ Vì $\widehat{BAC} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABH} = 30^\circ \Rightarrow AH = \frac{AB}{2}$ (1) Áp dụng định lý Pitago ta có: $AB^2 = AH^2 + BH^2$ và $BC^2 = BH^2 + HC^2$ $\Rightarrow BC^2 = AB^2 - AH^2 + HC^2 \Rightarrow BC^2 = AB^2 - AH^2 + (AC - AH)^2$ $\Rightarrow BC^2 = AB^2 - AH^2 + AC^2 - 2AC \cdot AH + AH^2$ $\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AC \cdot AH$ (2) Từ (1) & (2) $\Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 - AB \cdot AC$	0,25 0,25 0,25 0,25
2)	$\frac{p}{m-1} = \frac{m+n}{p} \Rightarrow p^2 = (m-1)(m+n)$ (*)	0,25

Vì p là số nguyên tố nên $p^2 \div 1$; $p^2 \div p$ và $p^2 \div p^2$	0,25
Với $m - 1 = 1$ và $m+n=p^2 \Rightarrow m = 2$ thay vào (*) suy ra $p^2 = n+2$	
Với $m - 1 = p$ và $m+n=p \Rightarrow n=-1$ (vô lí vì n là số tự nhiên)	0,25
Với $m-1=p^2$ và $m+n=1$ suy ra $n=-p^2$ (vô lí vì n là số tự nhiên)	0,25
Vậy $p^2 = n+2$	

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN - LỚP 7

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1. (4,0 điểm)

Cho biểu thức : $C = \frac{1}{3} - \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} - \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{99}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}$

Chứng minh rằng : $C < \frac{3}{16}$

Bài 2. (5,0 điểm)

Câu 1: Tìm x, y, z biết : $3x = 4y = 5z - 3x - 4y$ và $2x + y = z - 38$

Câu 2: Cho tỉ lệ thức $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{ab}{cd}$ với a, b, c, d $\neq 0$ và $c \neq -d$

Chứng minh rằng : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ hoặc $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$

Bài 3. (3,0 điểm)

Câu 1 : Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta luôn có

$4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n$ chia hết cho 300

Câu 2 : Cho $Q = \frac{27 - 2x}{12 - x}$. Tìm các số nguyên x để Q có giá trị nguyên ?

Bài 4. (3,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau

$$H = (3x - 2y)^2 - (4y - 6x)^2 - |xy - 24|$$

Bài 5. (5,0 điểm).

Cho ΔABC nhọn. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C dựng đoạn thẳng AD vuông góc với AB và $AD = AB$. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B dựng đoạn thẳng AE vuông góc với AC và $AE = AC$.

1) Chứng minh rằng $BE = CD$.

2) Gọi M là trung điểm của DE, tia MA cắt BC tại H. Chứng minh $MA \perp BC$

3) Nếu $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Hãy tính độ dài đoạn thẳng HC theo a, b, c ?

----- Hết -----

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN TOÁN - LỚP 7 NĂM HỌC 2018-2019**

Bài 1. (4,0 điểm) Cho biểu thức : $C = \frac{1}{3} - \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} - \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{99}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}$

Chứng minh rằng : $C < \frac{3}{16}$

Đáp án	Điểm
<i>Biến đổi:</i> $3C = 3 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} - \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{99}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}} \right) = 1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} - \frac{4}{3^3} + \dots + \frac{99}{3^{98}} - \frac{100}{3^{99}}$	0,25
Ta có $3C + C = \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} - \frac{4}{3^3} + \dots + \frac{99}{3^{98}} - \frac{100}{3^{99}} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} - \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{99}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}} \right)$	
$4C = 1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} - \frac{4}{3^3} + \dots + \frac{99}{3^{98}} - \frac{100}{3^{99}} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} - \frac{4}{3^4} + \dots + \frac{99}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}$	0,25
$4C = 1 + \left(\frac{-2}{3} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{3}{3^2} - \frac{2}{3^2} \right) + \left(\frac{-4}{3^3} + \frac{3}{3^3} \right) + \dots + \left(\frac{-100}{3^{99}} + \frac{99}{3^{99}} \right) - \frac{100}{3^{100}}$	0,25
$4C = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots - \frac{1}{3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}$	0,25
Đặt $D = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots - \frac{1}{3^{99}}$	
Ta có: $3D = 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots - \frac{1}{3^{99}} \right) = 3 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} + \dots - \frac{1}{3^{98}}$	0,25
Khi đó: $3D + D = \left(3 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} + \dots - \frac{1}{3^{98}} \right) + \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots - \frac{1}{3^{99}} \right)$	
$4D = 3 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} + \dots - \frac{1}{3^{98}} + 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \dots - \frac{1}{3^{99}}$	0,25

$4D = 3 + (-1+1) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \dots + \left(-\frac{1}{3^{98}} + \frac{1}{3^{98}}\right) - \frac{1}{3^{99}}$	0,25
$4D = 3 - \frac{1}{3^{99}}$	0,25
Suy ra $D = \frac{1}{4} \cdot \left(3 - \frac{1}{3^{99}}\right)$	0,25
$D = \frac{3}{4} - \frac{1}{4 \cdot 3^{99}}$	0,25
Nên ta có $4C = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4 \cdot 3^{99}}\right) - \frac{100}{3^{100}}$	0,25
$4C = \frac{3}{4} - \frac{1}{4 \cdot 3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}$	0,25
$\Rightarrow C = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4 \cdot 3^{99}} - \frac{100}{3^{100}}\right)$	0,25
$C = \frac{3}{16} - \frac{1}{4^2 \cdot 3^{99}} - \frac{25}{3^{100}}$	0,25
$C = \frac{3}{16} - \left(\frac{1}{4^2 \cdot 3^{99}} + \frac{25}{3^{100}}\right)$	0,25
Ta có $\frac{1}{4^2 \cdot 3^{99}} + \frac{25}{3^{100}} > 0$ nên $\frac{3}{16} - \left(\frac{1}{4^2 \cdot 3^{99}} + \frac{25}{3^{100}}\right) < \frac{3}{16}$. Vậy $C < \frac{3}{16}$	0,25

Bài 2. (5,0 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

Tìm x, y, z biết : $3x = 4y = 5z - 3x - 4y$ và $2x + y = z - 38$

Đáp án	Điểm
Ta có : $2x + y = z - 38$ nên $2x + y - z = -38$	0,25
+ Vì $3x = 4y = 5z - 3x - 4y$ nên $3x = 5z - 3x - 4y$	0,25
$\Rightarrow 3x = 5z - 6x \Rightarrow 9x = 5z$	
$\Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{z}{9} \Rightarrow \frac{x}{20} = \frac{z}{36}$ (1)	0,25
+ Vì $3x = 4y \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{3} \Rightarrow \frac{x}{20} = \frac{y}{15}$ (2)	0,25

Từ (1) và (2) suy ra $\frac{x}{20} = \frac{y}{15} = \frac{z}{36}$	0,25
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có : $\frac{x}{20} = \frac{y}{15} = \frac{z}{36} = \frac{2x + y - z}{2 \cdot 20 + 15 - 36} = \frac{-38}{19} = -2$	0,25
Do đó : $\frac{x}{20} = -2 \Rightarrow x = (-2) \cdot 20 = -40$	0,25
$\frac{y}{15} = -2 \Rightarrow y = (-2) \cdot 15 = -30$	0,25
$\frac{z}{36} = -2 \Rightarrow z = (-2) \cdot 36 = -72$	0,25
Vậy $x = -40$; $y = -30$; $z = -72$	0,25

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{ab}{cd}$ với $a, b, c, d \neq 0$; $c \neq -d$. Chứng minh rằng $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ hoặc $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$

Đáp án	Điểm
Ta có: $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{ab}{cd}$ nên $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{2ab}{2cd}$	0,25
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có $\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} = \frac{2ab}{2cd} = \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{c^2 + d^2 + 2cd} = \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{c^2 + d^2 - 2cd}$	
$= \frac{(a^2 + ab) + (b^2 + ab)}{(c^2 + cd) + (d^2 + cd)} = \frac{(a^2 - ab) + (b^2 - ab)}{(c^2 - cd) + (d^2 - cd)} = \frac{(a + b)^2}{(c + d)^2} = \frac{(a - b)^2}{(c - d)^2}$	0,25
Suy ra $\left(\frac{a + b}{c + d}\right)^2 = \left(\frac{a - b}{c - d}\right)^2 \Rightarrow \frac{a + b}{c + d} = \frac{a - b}{c - d}$ hoặc $\frac{a + b}{c + d} = \frac{b - a}{c - d}$	0,25
+ Với $\frac{a + b}{c + d} = \frac{a - b}{c - d}$ thì $(a + b) \cdot (c - d) = (a - b) \cdot (c + d)$	0,25
$\Rightarrow ac - ad + bc - bd = ac + ad - bc - bd$	0,25

$\Rightarrow ad = bc \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	0,25
+ Với $\frac{a+b}{c+d} = \frac{b-a}{c-d}$ thì $(a+b) \cdot (c-d) = (b-a) \cdot (c+d)$	0,25
$\Rightarrow ac - ad + bc - bd = bc + bd - ac - ad$	0,25
$\Rightarrow ac = bd \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{d}{c}$	0,25
Vậy nếu $\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2} = \frac{ab}{cd}$ với $a, b, c, d \neq 0; c \neq -d$ thì $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ hoặc $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$	0,25

Bài 3. (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta luôn có

$$4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n \text{ chia hết cho } 300$$

Đáp án	Điểm
Với mọi n nguyên dương, ta có $4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n = 4^n \cdot (4^3 + 4^2 - 4 - 1)$	0,25
$= 4^n \cdot (64 + 16 - 4 - 1) = 4^n \cdot 75$	0,25
$= 4^{n-1} \cdot 4 \cdot 75 = 300 \cdot 4^{n-1}$	0,25
Mà $300 \cdot 4^{n-1}$ chia hết cho 300 (với mọi n nguyên dương)	0,25
Nên $4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n$ chia hết cho 300 (với mọi n nguyên dương)	

Câu 2: (2,0 điểm) Cho $Q = \frac{27-2x}{12-x}$. Tìm các số nguyên x để Q có giá trị nguyên ?

Đáp án	Điểm
Điều kiện : $x \in \mathbb{Z}; x \neq 12$	0,25
Biến đổi $Q = \frac{27-2x}{12-x} = \frac{2 \cdot (12-x) + 3}{12-x} = 2 + \frac{3}{12-x}$	
Ta có $2 \in \mathbb{Z}; x \in \mathbb{Z}; x \neq 12$ nên Q có giá trị nguyên khi và chỉ khi $\frac{3}{12-x}$ có giá trị nguyên	0,25
Mà $\frac{3}{12-x}$ có giá trị nguyên khi và chỉ khi $12-x \in U(3)$	0,25
$U(3) = \{-3; -1; 1; 3\}$	
+ Nếu $12-x = -3$ thì $x = 15$ (thỏa mãn điều kiện)	0,25

+ Nếu $12 - x = -1$ thì $x = 13$ (thỏa mãn điều kiện)	0,25
+ Nếu $12 - x = 1$ thì $x = 11$ (thỏa mãn điều kiện)	0,25
+ Nếu $12 - x = 3$ thì $x = 9$ (thỏa mãn điều kiện)	0,25
Vậy Q có giá trị nguyên khi và chỉ khi $x \in \{9; 11; 13; 15\}$	0,25

Bài 4. (3,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau :

$$H = (3x - 2y)^2 - (4y - 6x)^2 - |xy - 24|.$$

Đáp án	Điểm
Ta có $H = (3x - 2y)^2 - (4y - 6x)^2 - xy - 24 $	
$= (3x - 2y)^2 - 4.(2y - 3x)^2 - xy - 24 = (3x - 2y)^2 - 4.(3x - 2y)^2 - xy - 24 $	0,25
$= -3.(3x - 2y)^2 - xy - 24 = -[3.(3x - 2y)^2 + xy - 24]$	
Ta có $3.(3x - 2y)^2 \geq 0$ với mọi giá trị của x, y	0,25
$ xy - 24 \geq 0$ với mọi giá trị của x, y	
Do đó $3.(3x - 2y)^2 + xy - 24 \geq 0$ với mọi giá trị của x, y	0,25
Nên $-[3.(3x - 2y)^2 + xy - 24] \leq 0$ với mọi giá trị của x, y	0,25
Hay $H \leq 0$ với mọi giá trị của x, y	
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $3x - 2y = 0$	0,25
và $xy - 24 = 0$ (1)	
+ Với $3x - 2y = 0$ thì $3x = 2y \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{3}$	0,25
Đặt $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = k$. Khi đó $x = 2k$; $y = 3k$	0,25
Thay $x = 2k$ và $y = 3k$ vào (1) ta được $2k \cdot 3k - 24 = 0$	0,25
$6k^2 = 24$	
$k^2 = 4 \Rightarrow k = 2$ hoặc $k = -2$	0,25
+ Với $k = 2$ thì $x = 2.2 = 4$ $y = 3.2 = 6$	0,25
+ Với $k = -2$ thì $x = 2.(-2) = -4$ $y = 3.(-2) = -6$	0,25

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức H là 0 khi và chỉ khi	$x = 4; y = 6$ hoặc $x = -4; y = -6$	0,25
--	---	------

Bài 5. (5,0 điểm).

	- Nếu hình vẽ sai thì không chấm cả bài hình - Nếu câu trước làm sai thì HS vẫn có thể sử dụng kết quả câu trước để làm câu sau.
1) (1,5 điểm). Chứng minh: $BE = CD$	.
+ Ta có $\angle DAC = \angle DAB + \angle BAC$ (Vì tia AB nằm giữa 2 tia AD và AC)	0,25
Mà $\angle BAD = 90^\circ$ (Vì $AB \perp AD$ tại A)	
Nên $\angle DAC = 90^\circ + \angle BAC$ (1)	
+ Ta có $\angle BAE = \angle CAE + \angle BAC$ (Vì tia AC nằm giữa 2 tia AB và AE)	0,25
Mà $\angle CAE = 90^\circ$ (Vì $AE \perp AC$ tại A)	
Nên $\angle BAE = 90^\circ + \angle BAC$ (2)	
Từ (1) và (2) suy ra $\angle BAE = \angle DAC$	0,25
Xét $\triangle ABE$ và $\triangle ADC$ có : $AB = AD$ (GT) $\angle BAE = \angle DAC$ (chứng minh trên) $AE = AC$ (GT) Do đó $\triangle ABE = \triangle ADC$ (c - g - c)	0,50
$\Rightarrow BE = CD$ (vì là hai cạnh tương ứng)	0,25
2) (2,5 điểm). Chứng minh: $MA \perp BC$	
+ Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN Từ D kẻ DF vuông góc với MA tại F	
Xét $\triangle MAE$ và $\triangle MDN$ có : $MN = MA$ (Vì M là trung điểm của AN)	0,25

AME = DMN (chứng minh trên) ME = MD (Vì M là trung điểm của DE) Do đó $\Delta MAE = \Delta MND$ (c - g - c)	
Suy ra AE = DN (vì là hai cạnh tương ứng) và NDM = MEA (vì là hai góc tương ứng)	0,25
Mà NDM và MEA ở vị trí so le trong của hai đường thẳng AE và DN Nên AE // DN (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)	0,25
Suy ra $ADN + DAE = 180^\circ$ (Vì là hai góc trong cùng phía) (3)	
+ Ta lại có $DAE + DAB + BAC + EAC = 360^\circ$	
Hay $DAE + BAC = 180^\circ$ (Vì $DAB = EAC = 90^\circ$) (4)	0,25
Từ (3) và (4) $\Rightarrow ADN = BAC$	
+ Ta có AE = DN (chứng minh trên) và AE = AC (GT) Nên AC = DN	0,25
Xét ΔABC và ΔDAN có : AB = AD (GT) ADN = BAC (chứng minh trên) AC = DN (chứng minh trên) Do đó $\Delta ABC = \Delta DAN$ (c - g - c)	0,25
Suy ra DNA = ACB (vì là hai góc tương ứng) hay DNF = ACB	
Ta có $DAF + BAD + BAH = 180^\circ$ (Vì ba điểm F, A, H thẳng hàng) Hay $DAF + BAH = 90^\circ$ (Vì $BAD = 90^\circ$) (5)	0,25
Trong ΔADF vuông tại F có : $FDA + DAF = 90^\circ$ (Vì là hai góc phụ nhau) (6)	
Từ (5) và (6) $\Rightarrow FDA = BAH$	
+ Ta có $ADN = NDF + FDA$ (Vì tia DF nằm giữa 2 tia DA và DN) $BAC = HAC + BAH$ (Vì tia AH nằm giữa 2 tia AB và AC)	0,25
Mà $ADN = BAC$ và $FDA = BAH$ (chứng minh trên)	
Nên NDF = HAC	
Xét ΔAHC và ΔDFN có : NDF = HAC (chứng minh trên) AC = DN (chứng minh trên) DNF = ACB (chứng minh trên) Do đó $\Delta AHC = \Delta DFN$ (g - c - g)	0,25
Suy ra DFN = AHC (vì là hai góc tương ứng)	
Mà $DFN = 90^\circ$ (Vì $DE \perp MA$ tại F) nên $AHC = 90^\circ$	0,25
Suy ra $MA \perp BC$ tại H (đpcm)	
3). (1,0 điểm). Nếu $AB = c, AC = b, BC = a$. Hãy tính độ dài đoạn thẳng HC theo a, b, c	

+ $MA \perp BC$ tại H (chứng minh trên) nên ΔAHB vuông tại H ΔAHC vuông tại H Đặt $HC = x \Rightarrow HB = a - x$ (Vì H nằm giữa B và C)	0,25
+ Áp dụng định lý Py-ta-go cho 2 tam giác vuông AHB và AHC ta có: $AH^2 = AB^2 - BH^2$ và $AH^2 = AC^2 - CH^2$	0,25
$\Rightarrow AB^2 - BH^2 = AC^2 - CH^2 \Rightarrow c^2 - (a - x)^2 = b^2 - x^2$	0,25
Từ đó tìm được $HC = x = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}$	0,25

Chú ý: Học sinh giải theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tương ứng với từng câu, từng bài theo hướng dẫn trên./.

----- Hết -----
Đề thi chọn học sinh giỏi
Môn: Toán lớp 7

Câu 1: (4,5 điểm).

1. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11}$

b) $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}$

2. Cho $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$. Tính giá trị biểu thức: $C = \frac{5x^2 + 3y^2}{10x^2 - 3y^2}$

Câu 2: (4,5 điểm)

1. Tìm các số x, y, z, biết:

a) $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}; \frac{y}{5} = \frac{z}{7}$ và $x + y + z = 92$

b) $(x - 1)^{2016} + (2y - 1)^{2016} + |x + 2y - z|^{2017} = 0$

2. Tìm x, y nguyên biết: $xy + 3x - y = 6$

Câu 3: (3,0 điểm)

1. Tìm đa thức A biết: $A - (3xy - 4y^2) = x^2 - 7xy + 8y^2$

2. Cho hàm số $y = f(x) = ax + 2$ có đồ thị đi qua điểm $A(a - 1; a^2 + a)$.

a) Tìm a

b) Với a vừa tìm được, tìm giá trị của x thỏa mãn: $f(2x - 1) = f(1 - 2x)$

Câu 4: (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE. Gọi I là giao điểm BE và CD. Chứng minh rằng:

a) $BE = CD$

b) BDE là tam giác cân

c) $\angle EIC = 60^\circ$ và IA là tia phân giác của $\angle DIE$

Câu 5: (2,0 điểm)

Chứng minh rằng: $3^{x+1} + 3^{x+2} + 3^{x+3} + \dots + 3^{x+100}$ chia hết cho 120 (với $x \in \mathbb{Z}$)

Hết

ĐÁP ÁN

Câu 1: 1.

a) $A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11} = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) \cdot \frac{11}{7} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) \cdot \frac{11}{7}$

$$A = \frac{11}{7} \left[\left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) \right] = \frac{11}{7} \left[\left(\frac{-3}{7} + \frac{-4}{7} \right) + \left(\frac{4}{11} + \frac{7}{11} \right) \right] = \frac{11}{7} [(-1) + 1] = \frac{11}{7} \cdot 0 = 0$$

b) $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - (2^2)^6 \cdot (3^2)^2}{2^{12} \cdot 3^6 + (2^3)^4 \cdot 3^5} = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 2^{12} \cdot 3^4}{2^{12} \cdot 3^6 + 2^{12} \cdot 3^5} = \frac{2^{12} \cdot 3^4 (3 - 1)}{2^{12} \cdot 3^5 (3 + 1)}$

$$B = \frac{2^{12} \cdot 3^4 \cdot 2}{2^{12} \cdot 3^5 \cdot 4} = \frac{1}{6}$$

2. Đặt $\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = k \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3k \\ y = 5k \end{cases}$. Khi đó:

$$C = \frac{5x^2 + 3y^2}{10x^2 - 3y^2} = \frac{5(3k)^2 + 3(5k)^2}{10(3k)^2 - 3(5k)^2} = \frac{45k^2 + 75k^2}{90k^2 - 75k^2} = \frac{120k^2}{15k^2} = 8$$

Câu 2: 1.

$$\text{a) Ta có: } \begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \\ \frac{y}{5} = \frac{z}{7} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{10} = \frac{y}{15} \\ \frac{y}{15} = \frac{z}{21} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x}{10} = \frac{y}{15} = \frac{z}{21}$$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và $x + y + z = 92$, ta được:

$$\frac{x}{10} = \frac{y}{15} = \frac{z}{21} = \frac{x+y+z}{10+15+21} = \frac{92}{46} = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{10} = 2 \\ \frac{y}{15} = 2 \\ \frac{z}{21} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = 30 \\ z = 42 \end{cases}$$

$$\text{b) Ta có: } (x-1)^{2016} \geq 0 \quad \forall x$$

$$(2y-1)^{2016} \geq 0 \quad \forall y$$

$$|x+2y-z|^{2017} \geq 0 \quad \forall x, y, z$$

$$\Rightarrow (x-1)^{2016} + (2y-1)^{2016} + |x+2y-z|^{2017} \geq 0 \quad \forall x, y, z$$

Mà $(x-1)^{2016} + (2y-1)^{2016} + |x+2y-z|^{2017} = 0$ nên dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} (x-1)^{2016} = 0 \\ (2y-1)^{2016} = 0 \\ |x+2y-z|^{2017} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{1}{2} \\ 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{1}{2} \\ z = 2 \end{cases}$$

$$2. \text{ Ta có: } xy + 3x - y = 6 \Leftrightarrow x(y+3) - (y+3) = 6-3$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(y+3) = 3 = 1.3 = 3.1 = (-1)(-3) = (-3)(-1)$$

Ta có bảng sau:

$x-1$	1	3	-1	-3
$y+3$	3	1	-3	-1

x	2	4	0	-2
y	0	-2	-6	-4

Vậy: $(x; y) = (2; 0) = (4; -2) = (0; 6) = (-2; -4)$

Câu 3:

1. Ta có: $A - (3xy - 4y^2) = x^2 - 7xy + 8y^2$

$$A = x^2 - 7xy + 8y^2 + (3xy - 4y^2)$$

$$A = x^2 - 4xy + 4y^2$$

2.

a) Vì đồ thị hàm số $y = f(x) = ax + 2$ đi qua điểm $A(a - 1; a^2 + a)$ nên:


$$a^2 + a = a(a - 1) + 2 \Leftrightarrow a^2 + a = a^2 - a + 2 \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1$$

b) Với $a = 1$ thì $y = f(x) = x + 2$

$$\text{Ta có: } f(2x - 1) = f(1 - 2x) \Leftrightarrow (2x - 1) + 2 = (1 - 2x) + 2 \Leftrightarrow 4x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

Câu 4:

GT	$\Delta ABC, A = 90^\circ, \Delta ABD$ và ΔACE đều $I = BE \cap CD$
KL	a) $BE = CD$ b) ΔBDE là tam giác cân c) $\angle EIC = 60^\circ$ và IA là tia phân giác của $\angle DIE$



$$\text{a) Ta có: } \begin{cases} \angle DAC = \angle A_1 + 90^\circ = 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ \\ \angle BAE = \angle A_2 + 90^\circ = 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ \end{cases} \Rightarrow \angle DAC = \angle BAE$$

Xét ΔDAC và ΔBAE có:

$$DA = BA \text{ (GT)}$$

$$DAC = BAE \text{ (CM trên)}$$

$$AC = AE \text{ (GT)}$$

$$\Rightarrow \triangle DAC = \triangle BAE \text{ (c - g - c)} \Rightarrow BE = CD \text{ (Hai cạnh tương ứng)}$$

$$\text{b) Ta có: } A_3 + A_1 + BAC + A_2 = 360^\circ$$

$$\Leftrightarrow A_3 + 60^\circ + 90^\circ + 60^\circ = 360^\circ$$

$$\Leftrightarrow A_3 = 150^\circ$$

$$\Rightarrow A_3 = DAC = 150^\circ$$

Xét $\triangle DAE$ và $\triangle BAE$ có:

$$DA = BA \text{ (GT)}$$

$$A_3 = DAC \text{ (CM trên)}$$

AE: Cạnh chung

$$\Rightarrow \triangle DAE = \triangle BAE \text{ (c - g - c)} \Rightarrow DE = BE \text{ (Hai cạnh tương ứng)}$$

$$\Rightarrow \triangle BDE \text{ là tam giác cân tại E}$$

$$\text{c) Ta có: } \triangle DAC = \triangle BAE \text{ (CM câu a)} \Rightarrow E_1 = C_1 \text{ (Hai góc tương ứng)}$$

$$\text{Lại có: } \hat{I}_1 + E_2 + ICE = 180^\circ \text{ (Tổng 3 góc trong } \triangle ICE)$$

$$\Leftrightarrow \hat{I}_1 + (AEC - E_1) + (C_1 + C_2) = 180^\circ$$

$$\Leftrightarrow \hat{I}_1 + 60^\circ - E_1 + C_1 + 60^\circ = 180^\circ$$

$$\Leftrightarrow \hat{I}_1 + 120^\circ = 180^\circ \text{ (Vì } E_1 = C_1)$$

$$\Leftrightarrow \hat{I}_1 = 60^\circ$$

Vì $\triangle DAE = \triangle BAE$ (Cm câu b) $\Rightarrow E_1 = E_2$ (Hai góc tương ứng) $\Rightarrow EA$ là tia phân giác của $\angle DEI$ (1)

$$\text{Vì } \begin{cases} \angle DAC = \angle BAE \\ \angle DAE = \angle BAE \end{cases} \Rightarrow \triangle DAC = \triangle DAE \Rightarrow D_1 = D_2 \text{ (Hai góc tương ứng)} \Rightarrow DA \text{ là}$$

tia phân giác của $\angle EDC$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow A$ là giao điểm của 2 tia phân giác trong $\triangle DIE \Rightarrow IA$ là đường phân giác thứ ba trong $\triangle DIE$ hay IA là tia phân giác của $\angle DIE$

Câu 5:

$$\begin{aligned} & 3^{x+1} + 3^{x+2} + 3^{x+3} + \dots + 3^{x+100} \\ &= (3^{x+1} + 3^{x+2} + 3^{x+3} + 3^{x+4}) + (3^{x+5} + 3^{x+6} + 3^{x+7} + 3^{x+8}) + \dots + (3^{x+97} + 3^{x+99} + 3^{x+100}) \\ &= 3^x(3 + 3^2 + 3^3 + 3^4) + 3^{x+4}(3 + 3^2 + 3^3 + 3^4) + \dots + 3^{x+96}(3 + 3^2 + 3^3 + 3^4) \\ &= 3^x \cdot 120 + 3^{x+4} \cdot 120 + \dots + 3^{x+96} \cdot 120 \\ &= 120 \cdot (3^x + 3^{x+4} + \dots + 3^{x+96}) \div 120 \text{ (đpcm)} \end{aligned}$$

Tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại:

<https://dehocsinhgioi.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7>

**PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
ĐỨC PHỐ**

NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN - LỚP 7

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi: 10/4/2016

Câu 1: (5 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức $P = \left| a - \frac{1}{2014} \right| + \left| a - \frac{1}{2016} \right|$, với $a = \frac{1}{2015}$.

b) Tìm số nguyên x để tích hai phân số $\frac{6}{x+1}$ và $\frac{x-1}{3}$ là một số nguyên.

Câu 2: (5 điểm)

a) Cho $a > 2$, $b > 2$. Chứng minh $ab > a + b$

b) Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với 4 và 5, diện tích hình thứ hai và diện tích hình thứ ba tỉ lệ với 7 và 8, hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài và tổng các chiều rộng của chúng là 27 cm, hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng, chiều dài của hình thứ ba là 24 cm. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó.

Câu 3: (3 điểm)

Cho $\triangle DEF$ vuông tại D và $DF > DE$, kẻ DH vuông góc với EF (H thuộc cạnh EF). Gọi M là trung điểm của EF.

a) Chứng minh $MDH = E - F$

b) Chứng minh $EF - DE > DF - DH$

Câu 4: (2 điểm)

Cho các số $0 < a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{15}$. Chứng minh rằng $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{15}}{a_5 + a_{10} + a_{15}} < 5$

Câu 5: (5 điểm)

Cho ΔABC có $A = 120^\circ$. Các tia phân giác BE , CF của ABC và ACB cắt nhau tại I (E , F lần lượt thuộc các cạnh AC , AB). Trên cạnh BC lấy hai điểm M , N sao cho $BIM = CIN = 30^\circ$.

- a) Tính số đo của MIN .
b) Chứng minh $CE + BF < BC$

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC PHỐ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

MÔN: TOÁN - LỚP 7

NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	NỘI DUNG ĐÁP ÁN	Điểm
1	a) Tính giá trị biểu thức $P = \left a - \frac{1}{2014} \right + \left a - \frac{1}{2016} \right $, với $a = \frac{1}{2015}$.	0.25
2.5 đ	Thay $a = \frac{1}{2015}$ vào biểu thức $P = \left \frac{1}{2015} - \frac{1}{2014} \right + \left \frac{1}{2015} - \frac{1}{2016} \right $	0.5
	Ta có $P = \frac{1}{2014} - \frac{1}{2015} + \frac{1}{2015} - \frac{1}{2016}$	0.5
	$P = \frac{1}{2014} - \frac{1}{2016}$	0.5
	$P = \frac{2016 - 2014}{2014 \cdot 2016} = \frac{2}{2014 \cdot 2016}$	0.5
	$P = \frac{1}{1007 \cdot 2016} = \frac{1}{2030112}$	0.25
2.5 đ	b) Tìm số nguyên x để tích hai phân số $\frac{6}{x+1}$ và $\frac{x-1}{3}$ là một số nguyên.	0.25
	Đặt $A = \frac{6}{x+1} \cdot \frac{x-1}{3}$	0.25
	$= \frac{2}{x+1} \cdot \frac{x-1}{1}$	0.25

	$= \frac{2(x-1)}{x+1}$ $= \frac{2x-2}{x+1}$ $= \frac{2(x+1)-4}{x+1}$ $= 2 - \frac{4}{x+1}$ Để A nhận giá trị nguyên thì $x+1$ là $U(4) = \{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$ Suy ra $x \in \{0; -2; 1; -3; 3; -5\}$	0.25 0.5
2	2. a) Cho $a > 2, b > 2$. Chứng minh $ab > a+b$	0.5
2đ	Từ $a > 2 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{2}$ $b > 2 \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{2}$ Suy ra $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} < 1 \Rightarrow \frac{a+b}{ab} < 1$ Vậy $ab > a+b$	0.5 0.5 0.5 0.5
3đ	b) Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với 4 và 5, diện tích hình thứ hai và diện tích hình thứ ba tỉ lệ với 7 và 8, hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài và tổng các chiều rộng của chúng là 27 cm, hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng, chiều dài của hình thứ ba là 24 cm. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó. Gọi diện tích ba hình chữ nhật lần lượt là S_1, S_2, S_3, chiều dài, chiều rộng tương ứng là $d_1, r_1; d_2, r_2; d_3, r_3$ theo đề bài ta có $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{5}; \frac{S_2}{S_3} = \frac{7}{8}$ và $d_1 = d_2; r_1 + r_2 = 27; r_2 = r_3, d_3 = 24$ Vì hình thứ nhất và hình thứ hai cùng chiều dài $\frac{S_1}{S_2} = \frac{4}{5} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \frac{r_1}{4} = \frac{r_2}{5} = \frac{r_1+r_2}{9} = \frac{27}{9} = 3$ Suy ra chiều rộng $r_1 = 12cm, r_2 = 15cm$ Vì hình thứ hai và hình thứ ba cùng chiều rộng $\frac{S_2}{S_3} = \frac{7}{8} = \frac{d_2}{d_3} \Rightarrow d_2 = \frac{7d_3}{8} = \frac{7 \cdot 24}{8} = 21cm$ Vậy diện tích hình thứ hai $S_2 = d_2 r_2 = 21 \cdot 15 = 315 cm^2$ Diện tích hình thứ nhất $S_1 = \frac{4}{5} S_2 = \frac{4}{5} \cdot 315 = 252 cm^2$ Diện tích hình thứ ba $S_3 = \frac{8}{7} S_2 = \frac{8}{7} \cdot 315 = 360 cm^2$	0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

3d	Cho $\triangle DEF$ vuông tại D và $DF > DE$, kẻ DH vuông góc với EF (H thuộc cạnh EF). Gọi M là trung điểm của EF. a) Chứng minh $MDH = E - F$ Hình vẽ đúng, chính xác Vì M là trung điểm của EF suy ra $MD = ME = MF$ $\Rightarrow \triangle MDE$ cân tại M $\Rightarrow E = MDE$ Mà $HDE = F$ cùng phụ với E Ta có $MDH = MDE - HDE$ Vậy $MDH = E - F$ b) Chứng minh $EF - DE > DF - DH$ Trên cạnh EF lấy K sao cho $EK = ED$, trên cạnh DF lấy I sao cho $DI = DH$ Ta có $EF - DE = EF - EK = KF$ $DF - DH = DF - DI = IF$ Ta cần chứng minh $KF > IF$ - $EK = ED \Rightarrow \triangle DHK \Rightarrow EDK = EKD$ - $EDK + KDI = EKD + HDK = 90^\circ$ $\Rightarrow KDI = HDK$ - $\triangle DHK = \triangle DIK$ (c-g-c) $\Rightarrow KID = DHK = 90^\circ$ Trong $\triangle KIF$ vuông tại I $\Rightarrow KF > FI$ điều phải chứng minh	0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
4 (2d)	Cho các số $0 < a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{15}$. Chứng minh rằng $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{15}}{a_5 + a_{10} + a_{15}} < 5$ Ta có $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 < 5a_5$ $a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} < 5a_{10}$ $a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} < 5a_{15}$ Suy ra $a_1 + a_2 + \dots + a_{15} < 5(a_5 + a_{10} + a_{15})$ Vậy $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{15}}{a_5 + a_{10} + a_{15}} < 5$	0.5 0.5 0.5 0.5
5 (5d)	Câu 5: (5 điểm) Cho $\triangle ABC$ có $A = 120^\circ$. Các tia phân giác BE, CF của $\angle ABC$ và $\angle ACB$ cắt nhau tại I (E, F lần lượt thuộc các cạnh AC, AB). Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho $BIM = CIN = 30^\circ$. a) Tính số đo của $\angle MIN$. b) Chứng minh $CE + BF < BC$ - Vẽ hình đúng, đủ, chính xác. a) Tính số đo của $\angle MIN$. Ta có $\angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - A = 60^\circ$ $\Rightarrow \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 30^\circ$ $\Rightarrow \angle BIC = 150^\circ$	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25

Mà $BIM = CIN = 30^0$ $\Rightarrow MIN = 90^0$ b) Chứng minh $CE + BF < BC$ - $BIC = 150^0 \Rightarrow FIB = EIC = 30^0$ Suy ra $\triangle BFI = \triangle BMI$ (g-c-g) $\Rightarrow BF = BM$ - $\triangle CNI = \triangle CEI$ (g-c-g) $\Rightarrow CN = CE$ Do đó $CE + BF = BM + CN < BM + MN + NC = BC$ Vậy $CE + BF < BC$	0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
---	---

- Một bài toán có thể có nhiều cách giải khác nếu đúng và phù hợp đều đạt điểm tối đa. Giám khảo cần thảo luận, thống nhất đáp án và biểu điểm trước khi chấm.

PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN LỚP 7

(Thời gian làm bài: 120 phút)

Câu 1. Tìm giá trị n nguyên dương:

a) $\frac{1}{27} \cdot 81^n = 3^n$;

b) $8 < 2^n < 64$

Câu 2. Thực hiện phép tính:

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8 \cdot 15} + \frac{1}{15 \cdot 22} + \dots + \frac{1}{43 \cdot 50}\right) \frac{4 - 3 - 5 - 7 - \dots - 49}{217}$$

Câu 3. Tìm các cặp số $(x; y)$ biết:

a) $\frac{x}{5} = \frac{y}{9}$ và $xy = 405$;

b) $\frac{1+5y}{24} = \frac{1+7y}{7x} = \frac{1+9y}{2x}$

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau :

a) $A = |x + 5| + 5$

b) $B = \frac{x^2 + 17}{x^2 + 7}$

Câu 5. Cho tam giác ABC ($CA < CB$), trên BC lấy các điểm M và N sao cho $BM = MN = NC$. Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AN tại I.

a) Chứng minh: I là trung điểm của AN

b) Qua K là trung điểm của AB kẻ đường thẳng vuông góc với đường phân giác góc ACB cắt đường thẳng AC tại E, đường thẳng BC tại F. Chứng minh $AE = BF$

Câu 1. Tìm giá trị n nguyên dương:

a) (2điểm) $\frac{1}{27} \cdot 81^n = 3^n; \Rightarrow 3^{4n-3} = 3^n \Rightarrow 4n-3 = n \Rightarrow n = 1$

b) (2điểm) $8 < 2^n < 64 \Rightarrow 2^3 < 2^n < 2^6 \Rightarrow n = 4, n = 5$

Câu 2. Thực hiện phép tính: (3điểm)

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8 \cdot 15} + \frac{1}{15 \cdot 22} + \dots + \frac{1}{43 \cdot 50} \right) \frac{4-3-5-7-\dots-49}{217} \\ &= \frac{1}{7} \left(1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{15} + \frac{1}{15} - \frac{1}{22} + \dots + \frac{1}{43} - \frac{1}{50} \right) \cdot \frac{5-(1+3+5+7+\dots+49)}{217} \\ &= \frac{1}{7} \left(1 - \frac{1}{50} \right) \cdot \frac{5-(12 \cdot 50 + 25)}{217} = \frac{1}{7} \cdot \frac{49}{50} \cdot \frac{5-625}{7 \cdot 31} = -\frac{7 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 31}{7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 31} = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

Câu 3. Tìm các cặp số $(x; y)$ biết:

(2điểm) a) $\frac{x}{5} = \frac{y}{9}$ và $xy = 405 \Rightarrow \frac{x^2}{25} = \frac{y^2}{81} = \frac{xy}{5 \cdot 9} = \frac{405}{45} = 9$

$$\Rightarrow x^2 = 9 \cdot 25 = 15^2 \Rightarrow x = \pm 15$$

$$\Rightarrow y^2 = 9 \cdot 81 = 27^2 \Rightarrow y = \pm 27$$

Do x, y cùng dấu nên:

$$x = 15; y = 27 \text{ và } x = -15; y = -27$$

(2điểm) b) $\frac{1+5y}{24} = \frac{1+7y}{7x} = \frac{1+9y}{2x}$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$$\frac{1+5y}{24} = \frac{1+7y}{7x} = \frac{1+9y}{2x} = \frac{1+9y-1-7y}{2x-7x} = \frac{2y}{-5x} = \frac{1+7y-1-5y}{7x-24} = \frac{2y}{7x-24}$$

$$\Rightarrow \frac{2y}{-5x} = \frac{2y}{7x-24} \Rightarrow -5x = 7x-24 \Rightarrow x = 2$$

Thay $x = 2$ vào trên ta được:

$$\frac{1+5y}{24} = \frac{y}{-5} \Rightarrow -5 - 25y = 24y \Rightarrow -49y = 5 \Rightarrow y = -\frac{5}{49}$$

$$\text{Vậy } x = 2, y = -\frac{5}{49} \text{ thỏa mãn đề bài}$$

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau:

a) (2điểm) $A = |x+5| + 5$

$$\text{Ta có: } |x+5| \geq 0. \text{ Dấu "}" xảy ra } \Leftrightarrow x = -5. \Rightarrow A \geq 5.$$

$$\text{Vậy: Min } A = 5 \Leftrightarrow x = -5.$$

b) (2điểm) $B = \frac{x^2 + 17}{x^2 + 7} = \frac{(x^2 + 7) + 10}{x^2 + 7} = 1 + \frac{10}{x^2 + 7}$

Ta có: $x^2 \geq 0$. Dấu = xảy ra $\Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow x^2 + 7 \geq 7$ (2 vế dương)

$$\Rightarrow \frac{10}{x^2 + 7} \leq \frac{10}{7} \Rightarrow 1 + \frac{10}{x^2 + 7} \leq 1 + \frac{10}{7} \Rightarrow B \leq \frac{17}{7}$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 0$

Vậy: $\text{Max } B = \frac{17}{7} \Leftrightarrow x = 0$.

Câu 5.

a) (3điểm) Từ I kẻ đường thẳng // BC cắt AB tại H. Nối MH.

Ta có: $\triangle BHM = \triangle IMH$ vì:

$\angle BHM = \angle IMH$ (so le trong)

$\angle BMH = \angle IHM$ (so le trong)

Cạnh HM chung $\Rightarrow BM = IH = MN$


$\triangle AHI = \triangle IMN$ vì:

$IH = MN$ (kết quả trên)

$\angle AHI = \angle IMN$ (= ABC)

$\angle AIH = \angle INM$ (đồng vị)

$\Rightarrow AI = IN$ (đpcm)



b) (2điểm) Từ A kẻ đường thẳng song song với BC cắt EF tại P. $\triangle PKA = \triangle FKB$ vì:

$\angle PKA = \angle FKB$ (đối đỉnh)

$\angle APK = \angle BFK$ (so le trong)

$AK = KB$ (gt)


$\Rightarrow AP = BF$ (1)

$\angle EPA = \angle KFC$ (đồng vị)

$\angle CEF = \angle KFC$ ($\triangle CFE$ cân)

$\Rightarrow \angle EPA = \angle CEF \Rightarrow \triangle APE$ cân

$\Rightarrow AP = AE$ (2). Từ (1) và (2) $\Rightarrow AE = BF$ (đpcm)



ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Số báo danh

.....

Câu 1 (5 điểm):

a) Cho biểu thức: $P = x - 4xy + y$. Tính giá trị của P với $|x| = 1,5$; $y = -0,75$

b) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 81}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}$

Câu 2 (4 điểm):

a) Tìm x, y, z, biết:

$$2x = 3y; 4y = 5z \text{ và } x + y + z = 11$$

b) Tìm x, biết: $|x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x$

Câu 3 (3 điểm). Cho hàm số: $y = f(x) = -4x^3 + x$

a) Tính $f(0)$, $f(-0,5)$

b) Chứng minh: $f(-a) = -f(a)$.

Câu 4 (1,0 điểm): Tìm cặp số nguyên (x;y) biết: $x + y = x.y$

Câu 5 (6 điểm): Cho $\triangle ABC$ có góc A nhỏ hơn 90° . Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là $\triangle ABM$ và $\triangle ACN$.

a) Chứng minh rằng: $\triangle AMC = \triangle ABN$;

b) Chứng minh: $BN \perp CM$;

c) Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Chứng minh AH đi qua trung điểm của MN.

Câu 6 (1 điểm): Cho ba số a, b, c thỏa mãn: $0 \leq a \leq b+1 \leq c+2$ và $a + b + c = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của c.

Hết


Chú ý: - Giám thị không giải thích gì thêm.

- Học sinh không được dùng máy tính.

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
HUYỆN HẬU LỘC**

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 7
NĂM HỌC 2013-2014**

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (5 điểm)	a) Ta có: $ x = 1,5 \Rightarrow x = 1,5$ hoặc $x = -1,5$ +) Với $x = 1,5$ và $y = -0,75$ thì $P = 1,5 - 4 \cdot 1,5(-0,75) - 0,75 = 1,5(1 + 3) = 6 - 0,75 = 5,25$ +) Với $x = -1,5$ và $y = -0,75$ thì $P = -1,5 - 4(-1,5)(-0,75) - 0,75 = -1,5(1+3) - 0,75 = -6,75$	1,5 1,5
	b) $A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 81}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 2^{12} \cdot 3^4}{2^{12} \cdot 3^6 - 2^{12} \cdot 3^5} = \frac{2^{12} \cdot 3^4(3-1)}{2^{12} \cdot 3^5(3-1)} = \frac{1}{3}$	2
Câu 2 (4 điểm)	a) $2x = 3y; 4y = 5z \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{y}{2}; \frac{y}{5} = \frac{z}{4} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{10}; \frac{y}{10} = \frac{z}{8}$ $\Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{10} = \frac{z}{8} = \frac{x+y+z}{15+10+8} = \frac{11}{33} = \frac{1}{3}$ $\Rightarrow x = 5; y = \frac{10}{3}; z = \frac{8}{3}$	1 1
	b) $ x+1 + x+2 + x+3 = 4x$ (1) Vì VT $\geq 0 \Rightarrow 4x \geq 0$ hay $x \geq 0$, do đó: $ x+1 = x+1; x+2 = x+2; x+3 = x+3$ (1) $\Rightarrow x+1+x+2+x+3=4x \Rightarrow x=6$	1 1
	a) $f(0) = 0$ $f(-0,5) = -4 \cdot (-\frac{1}{2})^3 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$	1 1
Câu 3 (3 điểm)	b) $f(-a) = -4(-a)^3 - a = 4a^3 - a$ $-f(a) = -[-4a^3 + a] = 4a^3 - a$ $\Rightarrow f(-a) = -f(a)$	0,5 0,5

Câu 4 (1 điểm)	$x + y = x.y \Rightarrow xy - x = y \Rightarrow x(y - 1) = y \Rightarrow x = \frac{y}{y-1}$ vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow y: y-1 \Rightarrow y-1+1: y-1 \Rightarrow 1: y-1$, do đó $y - 1 = \pm 1 \Rightarrow y = 2$ hoặc $y = 0$ Nếu $y = 2$ thì $x = 2$ Nếu $y = 0$ thì $x = 0$ Vậy các cặp số nguyên $(x;y)$ là: $(0,0)$ và $(2;2)$	0,5 0,5
Câu 5 (6 điểm)	a) Xét $\triangle AMC$ và $\triangle ABN$, có: $AM = AB$ ($\triangle AMB$ vuông cân) $AC = AN$ ($\triangle ACN$ vuông cân) $\angle MAC = \angle NAC$ ($= 90^\circ + \angle BAC$) Suy ra $\triangle AMC = \triangle ABN$ (c - g - c) 	1,0 1,0 0,5
	b) Gọi I là giao điểm của BN với AC, K là giao điểm của BN với MC. Xét $\triangle KIC$ và $\triangle AIN$, có: $\angle ANI = \angle KCI$ ($\triangle AMC = \triangle ABN$) $\angle AIN = \angle KIC$ (đối đỉnh) $\Rightarrow \angle IKC = \angle NAI = 90^\circ$, do đó: $MC \perp BN$	1 1 0,5
	c) Kẻ $ME \perp AH$ tại E, $NF \perp AH$ tại F. Gọi D là giao điểm của MN và AH. - Ta có: $\angle BAH + \angle MAE = 90^\circ$ (vì $\angle MAB = 90^\circ$) Lại có $\angle MAE + \angle AME = 90^\circ$, nên $\angle AME = \angle BAH$ Xét $\triangle MAE$ và $\triangle ABH$, vuông tại E và H, có: $\angle AME = \angle BAH$ (chứng minh trên) $MA = AB$ Suy ra $\triangle MAE = \triangle ABH$ (cạnh huyền-góc nhọn) $\Rightarrow ME = AH$ - Chứng minh tương tự ta có $\triangle AFN = \triangle CHA$ $\Rightarrow FN = AH$ Xét $\triangle MED$ và $\triangle NFD$, vuông tại E và F, có: $ME = NF (= AH)$ $\angle EMD = \angle FND$ (phụ với $\angle MDE$ và $\angle FDN$, mà $\angle MDE = \angle FDN$)	0,25 0,25 0,25

	$\Rightarrow \Delta MED = \Delta NFD \Rightarrow BD = ND$. Vậy AH đi qua trung điểm của MN.	0,25
Câu 6 (1 điểm)	Vì: $0 \leq a \leq b+1 \leq c+2$ nên $0 \leq a+b+1+c+2 \leq c+2+c+2+c+2$ $\Rightarrow 0 \leq 4 \leq 3c+6$ (vì $a+b+c=1$) Hay $3c \geq -2 \Rightarrow c \geq -\frac{2}{3}$. Vậy giá trị nhỏ nhất của c là: $-\frac{2}{3}$ khi đó $a+b = \frac{5}{3}$	0,5 0,5

Chú ý: - Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Học sinh không vẽ hình hoặc vẽ sai cơ bản thì không chấm bài hình.

PHÒNG GD-ĐT HÒA BÌNH

Đề chính thức

Gồm 01 trang

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6, 7

NĂM HỌC 2009 – 2010

Môn thi: Toán 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4đ):

a) Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{99.100}$$

b) Tính:

$$2^4 + 8 \left[(-2)^2 : \frac{1}{2} \right]^0 - 2^{-2} \cdot 4 + (-2)^2$$

Câu 2 (4đ):

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và 7B là 0,8. Lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được?

Câu 3 (4đ):

Tìm x biết:

a) $\frac{1}{2} - x : \frac{3}{5} = 2$

b) $2^{x+\frac{1}{2}} = 8$

Câu 4 (4đ):

Ba đội máy ủi đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành trong 6 ngày, đội thứ ba hoàn thành trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (cùng công suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy.

Câu 5 (4đ):

Cho góc xOy . Trên Ox lấy hai điểm A và B, trên Oy lấy hai điểm C và D sao cho $OA = OC$, $AB =$

CD. Chứng minh:

a) $\triangle ABC = \triangle ACD$

b) $\triangle ABD = \triangle BCD$

----- Hết -----

HƯỚNG DẪN CHẤM-HÒA BÌNH

Câu 1 (4đ):

a) Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{99.100}$$

Ta có: $\frac{1}{1.2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$; $\frac{1}{2.3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$; ...; $\frac{1}{99.100} = \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ (1đ)

$$A = 1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{99}\right) - \frac{1}{100} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100} \quad (1đ)$$

b) Tính:

$$2^4 + 8 \left[(-2)^2 : \frac{1}{2}\right]^0 - 2^{-2} \cdot 4 + (-2)^2 = 16 + 8 \cdot 1 - 2^{-2} \cdot 2^2 + 4 \quad (1đ)$$

$$= 16 + 8 \cdot 2^0 + 4$$

$$= 16 + 8 - 1 + 4 = 27 \quad (1đ)$$

Câu 2 (4đ):

Gọi x, y theo thứ tự là số cây trồng được của lớp 7A, 7B. Ta có:

$$y - x = 20 \text{ và } \frac{x}{y} = 0,8 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \quad (1) \quad (1đ)$$

Từ (1) ta có tỉ lệ thức: $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{y-x}{5-4} = \frac{20}{1} = 20 \quad (2) \quad (1đ)$

Từ (2) ta có: $\frac{x}{4} = 20 \Rightarrow x = 80$ cây (lớp 7A) (1đ)

$$\frac{y}{5} = 20 \Rightarrow y = 100 \text{ cây (lớp 7B)} \quad (1đ)$$

Câu 3 (4đ):

a) $\frac{1}{2} - x : \frac{3}{5} = 2$

$$x : \frac{3}{5} = \frac{1}{2} - 2 \quad (0,5đ)$$

$$x : \frac{3}{5} = \frac{-3}{2} \quad (0,5đ)$$

$$x = \frac{-3}{2} \cdot \frac{3}{5} \quad (0,5đ)$$

$$x = \frac{-9}{10} \quad (0,5đ)$$

$$b) 2^{x+\frac{1}{2}} = 8$$

$$2^{x+\frac{1}{2}} = 2^3 \quad (0,5đ)$$

$$x + \frac{1}{2} = 3 \quad (0,5đ)$$

$$x = 3 - \frac{1}{2} \quad (0,5đ)$$

$$x = \frac{5}{2} \quad (0,5đ)$$

Câu 4 (4đ):

Gọi x, y, z theo thứ tự là số máy ủi của đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba

Do các máy có cùng công suất, khối lượng công việc của ba đội như nhau

$\Rightarrow$ Số máy và thời gian hoàn thành công việc là tỉ lệ nghịch với nhau (1đ)

Ta có: $\frac{x}{\frac{1}{4}} = \frac{y}{\frac{1}{6}} = \frac{z}{\frac{1}{8}}$ và $x - y = 2$ (1đ)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$$\frac{x-y}{\frac{1}{4} - \frac{1}{6}} = \frac{2}{\frac{1}{12}} = 24 \quad (1đ)$$

Từ đó: $\frac{x}{\frac{1}{4}} = 24 \Rightarrow x = 6$ (số máy của đội thứ nhất)

$$\frac{y}{\frac{1}{6}} = 24 \Rightarrow y = 4 \text{ (số máy của đội thứ hai)}$$

$$\frac{z}{\frac{1}{8}} = 24 \Rightarrow z = 3 \text{ (số máy của đội thứ ba)} \quad (1đ)$$

Câu 5 (4đ):

Giả thiết: góc xOy ; $OA=OC$, $AB=CD$

Kết luận: a) $\triangle ABC = \triangle ACD$

b) $\triangle ABD = \triangle BCD$

(Hình vẽ và GT, KL 0,5đ)

Xét $\triangle OAD$ và $\triangle OCB$ có:


- Góc O chung

- $OA = OC$ (gt)

- $OB = OD$

Do đó: $\triangle OAD = \triangle OCB$ (c-g-c) $\Rightarrow AD = BC$

a) Xét $\triangle ABC$ và $\triangle ACD$ có



(1,5đ)

- AB = CD (gt)

- AC chung

- AD = BC

Do đó: $\triangle ABC = \triangle ACD$

(1đ)

b) Xét $\triangle ABD$ và $\triangle BCD$ có

- AB = CD (gt)

- BD chung

- AD = BC

Do đó: $\triangle ABD = \triangle BCD$

(1đ)

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa của câu đó

----- Hết -----

**PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
H- ONG KHÊ**

**KÚ THI CHẤM HẠC SINH GIÁI HUYỀN
N" M HẠC 2017 - 2018**

MÔN TOÁN LỚP 7

Khóa ngày **17.18.19 - 4 - 2012**

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: **120 phút** (không kể thời gian giao đề)

Bài 1:

1) Tìm x, biết $|x-1| = \frac{2}{3}$;

2) Tính giá trị của biểu thức sau: $A = \frac{2x^2 + 3x - 1}{3x - 2}$ với $|x-1| = \frac{2}{3}$

Bài 2:

1) Tìm chữ số tận cùng của A biết $A = 3^{n+2} - 2^{n+2} + 3^n - 2^n$

2) Tìm các giá trị nguyên của x để $\frac{x+3}{x-2}$ nhận giá trị nguyên.

Bài 3: Cho đa thức f(x) xác định với mọi x thỏa mãn:

$$x.f(x+2) = (x^2 - 9).f(x).$$

1) Tính f(5).

2) Chứng minh rằng f(x) có ít nhất 3 nghiệm.

Bài 4: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh C bờ là đường thẳng AB dựng đoạn AE vuông góc với AB và AE = AB. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh B bờ là đường thẳng AC dựng đoạn AF vuông góc với AC và AF = AC. Chứng minh rằng:

a) FB = EC

b) EF = 2AM

c) $AM \perp EF$.


Bài 5: Cho a, b, c, d là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = |x - a| + |x - b| + |x - c| + |x - d|$$

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN LỚP 7

Khóa ngày 17.18.19 - 4 - 2012

Bài	Hướng dẫn chấm	Điểm
1(6đ)	1) Ta có $ x-1 = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = \frac{2}{3} \\ x-1 = -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{3} \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$	4.0đ
	2) Từ câu 1) Với $x = 5/3$ thay vào A ta được $A = 14/27$ Với $x = 1/3$ thay vào A ta được $A = -2/9$	2.0đ
2 (3đ)	1) Chứng minh A chia hết cho 10 suy ra chữ số tận cùng của A là 0	1.5đ
	2) Ta có: $\frac{x+3}{x-2} = \frac{x-2+5}{x-2} = 1 + \frac{5}{x-2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x-2 \in U(5) = \{\pm 1; \pm 5\}$ $\Rightarrow x = 1; 3; -3; 7$	1.5đ
3(4đ)	1) Ta có với $x = 3 \Rightarrow f(5) = 0$	2.0đ
	2) $x = 0 \Rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow x = 0$ là một nghiệm $x = 3 \Rightarrow f(5) = 0 \Rightarrow x = 5$ là một nghiệm $x = -3 \Rightarrow f(-1) = 0 \Rightarrow x = -1$ là một nghiệm Vậy $f(x)$ có ít nhất là 3 nghiệm.	2.0đ
4	a) Chứng minh $\triangle ABF = \triangle AEC(cgc) \Rightarrow FB = EC$	3.0đ

(6đ)	 b) Trên tia đối của tia MA lấy K sao cho $AK = 2AM$. Ta có $\triangle ABM = \triangle KCM \Rightarrow CK \parallel AB$ $\Rightarrow \angle ACK + \angle CAB = \angle EAF + \angle CAB = 180^\circ \Rightarrow \angle ACK = \angle EAF$ $\triangle EAF$ và $\triangle KCA$ có $AE = AB = CK$; $AF = AC$ (gt); $\angle ACK = \angle EAF$ $\Rightarrow \triangle EAF = \triangle KCA$ (cgc) $\Rightarrow EF = AK = 2AM$. c) Từ $\triangle EAF = \triangle KCA$ $\Rightarrow \angle CAK = \angle AFE \Rightarrow \angle AFE + \angle FAK = \angle CAK + \angle FAK = 90^\circ$ $\Rightarrow AK \perp EF$	1.5đ 1.5đ
5(1đ)	Không mất tính tổng quát, giả sử $a \leq b \leq c \leq d$. Áp dụng BĐT $a + b \geq a + b$, dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow ab \geq 0$ ta có: $ x - a + x - d \geq x - a + d - x \geq x - a + d - x = d - a \quad (1)$ $ x - b + x - c \geq x - b + c - x \geq x - b + c - x = c - b \quad (2)$ Suy ra $A \geq c + d - a - b$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi dấu “=” ở (1) và (2) xảy ra $\Leftrightarrow (x - a)(d - x) \geq 0$ và $(x - b)(c - x) \geq 0 \Leftrightarrow a \leq x \leq d$ và $b \leq x \leq c$. Do đó $\min A = c + d - a - b \Leftrightarrow b \leq x \leq c$.	1.0đ

Ghi chú: Các cách giải khác đầy đủ và chính xác vẫn cho điểm tối đa.

UBND HUYỆN KIM SƠN
PHÒNG GD&ĐT

KỶ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 7 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2010-2011

Môn: Toán - Lớp 7

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (2,0 điểm)

a. Tìm x, y biết: $\frac{4+x}{7+y} = \frac{4}{7}$ và $x + y = 22$

b. Cho $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ và $\frac{y}{5} = \frac{z}{6}$. Tính $M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z}$

Bài 2: (2,0 điểm)

Thực hiện tính:

a. $S = 2^{2010} - 2^{2009} - 2^{2008} \dots - 2 - 1$

$$\text{b. } P = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{16}(1+2+3+\dots+16)$$

Bài 3: (2,0 điểm)

Tìm x biết:

a. $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{5}{12} \cdots \frac{30}{62} \cdot \frac{31}{64} = 2^x$

b. $\frac{4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5}{3^5 + 3^5 + 3^5} \cdot \frac{6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5} = 2^x$

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\widehat{B} < 90^\circ$ và $\widehat{B} = 2\widehat{C}$. Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = BH. Đường thẳng HE cắt AC tại D.

a. Chứng minh $\widehat{BEH} = \widehat{ACB}$.

b. Chứng minh DH = DC = DA.

c. Lấy B' sao cho H là trung điểm của BB'. Chứng minh tam giác AB'C cân.

d. Chứng minh AE = HC.

UBND HUYỆN KIM SƠN
PHÒNG GD&ĐT

KỶ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 7 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2009-2010

Môn: Toán - Lớp 7

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1: (2,0 điểm)

$\Rightarrow 28 + 7x = 28 + 4y$	0,25
$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{x+y}{4+7}$	0,25
$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{22}{11} = 2 \Rightarrow x = 8; y = 14$	0,25
$\frac{x}{3} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20}; \frac{y}{5} = \frac{z}{6} \Rightarrow \frac{y}{20} = \frac{z}{24} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20} = \frac{z}{24}$ (1)	0,25

$(1) \Rightarrow \frac{2x}{30} = \frac{3y}{60} = \frac{4z}{96} = \frac{2x+3y+4z}{30+60+96}$	0,25
$(1) \Rightarrow \frac{3x}{45} = \frac{4y}{80} = \frac{5z}{120} = \frac{3x+4y+5z}{45+80+120}$	0,25
$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{30+60+96} = \frac{3x+4y+5z}{45+80+120} = \frac{2x}{30} = \frac{3x}{45}$	0,25
$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{186} \cdot \frac{245}{3x+4y+5z} = 1 \Rightarrow M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z} = \frac{186}{245}$	0,25

Bài 2: (2,0 điểm)

Thực hiện tính:

$2S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2009} \dots - 2^2 - 2$	0,25
$2S - S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2010} - 2^{2009} + 2^{2009} \dots - 2^2 + 2^2 - 2 + 2 + 1$	0,25
$S = 2^{2011} - 2 \cdot 2^{2010} + 1$	0,25
$S = 2^{2011} - 2^{2011} + 1 = 1$	0,25
$P = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2.3}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3.4}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4.5}{2} + \dots + \frac{1}{16} \cdot \frac{16.17}{2}$	0,25
$= \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{17}{2}$	0,25
$= \frac{1}{2}(1+2+3+\dots+17-1)$	0,25
$= \frac{1}{2} \left(\frac{17.18}{2} - 1 \right) = 76$	0,25

Bài 3: (2,0 điểm)

$\frac{1}{2.2} \cdot \frac{2}{2.3} \cdot \frac{3}{2.4} \cdot \frac{4}{2.5} \cdot \frac{5}{2.6} \dots \frac{30}{2.31} \cdot \frac{31}{2^6} = 2^x$	0,25
$\frac{1.2.3.4 \dots 30.31}{1.2.3.4 \dots 30.31.2^{30} \cdot 2^6} = 2^x$	0,25
$\frac{1}{2^{36}} = 2^x$	0,25
$x = -36$	0,25
$\frac{4.4^5}{3.3^5} \cdot \frac{6.6^5}{2.2^5} = 2^x$	0,25
$\frac{4^6}{3^6} \cdot \frac{6^6}{2^6} = 2^x$	0,25
$\left(\frac{6}{3}\right)^6 \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^6 = 2^x$	0,25
$2^{12} = 2^x \Rightarrow x = 12$	0,25

Bài 4: (4,0 điểm)

Câu a: 0,75 điểm		Hình vẽ:
BEH cân tại B nên $\widehat{E} = \widehat{H_1}$	0,25	
$\widehat{ABC} = \widehat{E} + \widehat{H_1} = 2\widehat{E}$	0,25	
$\widehat{ABC} = 2\widehat{C} \Rightarrow \widehat{BEH} = \widehat{ACB}$	0,25	
Câu b: 1,25 điểm		
Chứng tỏ được ΔDHC cân tại D nên $DC = DH$.	0,50	
ΔDAH có: $\widehat{DAH} = 90^0 - \widehat{C}$	0,25	
$\widehat{DHA} = 90^0 - \widehat{H_2} = 90^0 - \widehat{C}$	0,25	
$\Rightarrow \Delta DAH$ cân tại D nên $DA = DH$.	0,25	
Câu c: 1,0 điểm		
$\Delta ABB'$ cân tại A nên $\widehat{B'} = \widehat{B} = 2\widehat{C}$	0,25	
$\widehat{B'} = \widehat{A_1} + \widehat{C}$ nên $2\widehat{C} = \widehat{A_1} + \widehat{C}$	0,50	
$\Rightarrow \widehat{C} = \widehat{A_1} \Rightarrow \Delta AB'C$ cân tại B'	0,25	
Câu d: 1,0 điểm		
$AB = AB' = CB'$	0,25	
$BE = BH = B'H$	0,25	
Có: $AE = AB + BE$ $HC = CB' + B'H$ $\Rightarrow AE = HC$	0,50	

UBND HUYỆN QUẾ SƠN
PHÒNG GD&ĐT

KỶ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2009-2010

Môn: Toán - Lớp 7

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2,0 điểm)

a. Tìm x, y biết: $\frac{4+x}{7+y} = \frac{4}{7}$ và $x + y = 22$

b. Cho $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ và $\frac{y}{5} = \frac{z}{6}$. Tính $M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z}$

Bài 2: (2,0 điểm)

Thực hiện tính:

a. $S = 2^{2010} - 2^{2009} - 2^{2008} \dots - 2 - 1$

b. $P = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{16}(1+2+3+\dots+16)$

Bài 3: (2,0 điểm)

Tìm x biết:

a. $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{5}{12} \dots \frac{30}{62} \cdot \frac{31}{64} = 2^x$

b. $\frac{4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5}{3^5 + 3^5 + 3^5} \cdot \frac{6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5} = 2^x$

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\widehat{B} < 90^\circ$ và $\widehat{B} = 2\widehat{C}$. Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = BH. Đường thẳng HE cắt AC tại D.

a. Chứng minh $\widehat{BEH} = \widehat{ACB}$.

b. Chứng minh DH = DC = DA.

c. Lấy B' sao cho H là trung điểm của BB'. Chứng minh tam giác AB'C cân.

d. Chứng minh AE = HC.

Bài 1: (2,0 điểm)

$\Rightarrow 28+7x=28+4y$	0,25
$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{x+y}{4+7}$	0,25
$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{22}{11} = 2 \Rightarrow x=8; y=14$	0,25
$\frac{x}{3} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20}; \frac{y}{5} = \frac{z}{6} \Rightarrow \frac{y}{20} = \frac{z}{24} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20} = \frac{z}{24} \quad (1)$	0,25
$(1) \Rightarrow \frac{2x}{30} = \frac{3y}{60} = \frac{4z}{96} = \frac{2x+3y+4z}{30+60+96}$	0,25
$(1) \Rightarrow \frac{3x}{45} = \frac{4y}{80} = \frac{5z}{120} = \frac{3x+4y+5z}{45+80+120}$	0,25
$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{30+60+96} \cdot \frac{3x+4y+5z}{45+80+120} = \frac{2x}{30} \cdot \frac{3x}{45}$	0,25
$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{186} \cdot \frac{245}{3x+4y+5z} = 1 \Rightarrow M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z} = \frac{186}{245}$	0,25

Bài 2: (2,0 điểm) Thực hiện tính:

$2S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2009} \dots - 2^2 - 2$	0,25
$2S-S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2010} - 2^{2009} + 2^{2009} \dots - 2^2 + 2^2 - 2 + 2 + 1$	0,25
$S = 2^{2011} - 2 \cdot 2^{2010} + 1$	0,25
$S = 2^{2011} - 2^{2011} + 1 = 1$	0,25
$P = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2.3}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3.4}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4.5}{2} + \dots + \frac{1}{16} \cdot \frac{16.17}{2}$	0,25
$= \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{17}{2}$	0,25
$= \frac{1}{2}(1+2+3+\dots+17-1)$	0,25
$= \frac{1}{2} \left(\frac{17.18}{2} - 1 \right) = 76$	0,25


Bài 3: (2,0 điểm)

$\frac{1}{2.2} \cdot \frac{2}{2.3} \cdot \frac{3}{2.4} \cdot \frac{4}{2.5} \cdot \frac{5}{2.6} \dots \frac{30}{2.31} \cdot \frac{31}{2^6} = 2^x$	0,25
$\frac{1.2.3.4 \dots 30.31}{1.2.3.4 \dots 30.31.2^{30}.2^6} = 2^x$	0,25
$\frac{1}{2^{36}} = 2^x$	0,25
$x = -36$	0,25

$\frac{4.4^5}{3.3^5} \cdot \frac{6.6^5}{2.2^5} = 2^x$	0,25
$\frac{4^6}{3^6} \cdot \frac{6^6}{2^6} = 2^x$	0,25
$\left(\frac{6}{3}\right)^6 \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^6 = 2^x$	0,25
$2^{12} = 2^x \Rightarrow x = 12$	0,25

Bài 4: (4,0 điểm)

Câu a: 0,75 điểm	Hình vẽ:
BEH cân tại B nên $\widehat{E} = \widehat{H_1}$	0,25
$\widehat{ABC} = \widehat{E} + \widehat{H_1} = 2\widehat{E}$	0,25
$\widehat{ABC} = 2\widehat{C} \Rightarrow \widehat{BEH} = \widehat{ACB}$	0,25
Câu b: 1,25 điểm	
Chúng ta được $\triangle DHC$ cân tại D nên $DC = DH$.	0,50
$\triangle DAH$ có: $\widehat{DAH} = 90^\circ - \widehat{C}$	0,25
$\widehat{DHA} = 90^\circ - \widehat{H_2} = 90^\circ - \widehat{C}$	0,25
$\Rightarrow \triangle DAH$ cân tại D nên $DA = DH$.	0,25
Câu c: 1,0 điểm	
$\triangle ABB'$ cân tại A nên $\widehat{B'} = \widehat{B} = 2\widehat{C}$	0,25
$\widehat{B'} = \widehat{A_1} + \widehat{C}$ nên $2\widehat{C} = \widehat{A_1} + \widehat{C}$	0,50
$\Rightarrow \widehat{C} = \widehat{A_1} \Rightarrow \triangle AB'C$ cân tại B'	0,25
Câu d: 1,0 điểm	
$AB = AB' = CB'$	0,25
$BE = BH = B'H$	0,25
Có: $AE = AB + BE$ $HC = CB' + B'H$ $\Rightarrow AE = HC$	0,50



MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: 18/04/2012

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Thực hiện phép tính

a. $\frac{5}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right) + \frac{5}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right)$

b. $\frac{69}{157} - \left(2 + \left(3 + \left(4 + 5^{-1} \right)^{-1} \right)^{-1} \right)^{-1}$

c. $\frac{5.4^{15}.9^9 - 4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19} - 7.2^{29}.27^6}$

Câu 2:

a, Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Chứng minh rằng : $(a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d)$

b. Tìm hai số nguyên biết: Tổng, hiệu (số lớn trừ số bé), thương (số lớn chia số bé) của hai số đó cộng lại bằng 38.

Câu 3: Tìm x biết:

a) $\frac{1}{2} - \left| x + \frac{1}{5} \right| = \frac{1}{3}$

b) $\frac{3}{4} - |2x + 1| = \frac{7}{8}$

Câu 4:

Cho tam giác ABC với M trung điểm BC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C vẽ tia Ax vuông góc AB và lấy D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B vẽ Ay vuông góc AC và lấy AE = AC. Chứng minh:

a, $AM = \frac{1}{2} ED$

b, $AM \perp DE$

===== Hết =====


HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN 7

Ngày thi: 18/04/2012

Câu	Hướng dẫn chấm	điểm
1	a. $\frac{5}{9} : \left(\frac{1}{11} - \frac{5}{22} \right) + \frac{5}{9} : \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{3} \right) = -5$	1

	b. $\frac{69}{157} - \left(2 + \left(3 + \left(4 + 5^{-1} \right)^{-1} \right)^{-1} \right)^{-1} = \frac{1}{157}$ c. $\frac{5.4^{15}.9^9 - 4.3^{20}.8^9}{5.2^9.6^{19} - 7.2^{29}.27^6} = 2$	1 1
2	a, Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Chứng minh rằng : $(a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d)$ Ta có: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a.d = b.c$ Xét: $(a+2c)(b+d) = ab+ad+2bc+2cd = ab+3bc+2cd$ Và $(a+c)(b+2d) = ab+2ad+bc+2cd = ab+3bc+2cd$ Vậy: $(a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d)$. b. Tìm hai số nguyên biết : Tổng, hiệu (số lớn trừ số bé), thương (số lớn chia số bé) của hai số đó cộng lại bằng 38. Gọi hai số cần tìm là a và b (a,b thuộc Z và b khác 0) Giả sử $a > b$, khi đó có: $(a+b) + (a-b) + a:b = 38$ $\Rightarrow 2a + a:b = 38$ $\Rightarrow 2ab + a = 38b$ $\Rightarrow a = 38b : (2b + 1) = (38b + 19 - 19) : (2b + 1) = 19 - (19/(2b+1))$ Để a thuộc Z thì $2b + 1$ phải là ước của 19. $\Rightarrow 2b+1 = 1 \Rightarrow b = 0$ (loại) $2b+1 = -1 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow a = -38$ (loại) $2b+1 = 19 \Rightarrow b = 9 \Rightarrow a = 18$ $2b+1 = -19 \Rightarrow b = -10 \Rightarrow a = 20$ Vậy có 2 cặp số thỏa mãn: (18;9) và (20; -10)	1 2
3	a) $\frac{1}{2} - \left x + \frac{1}{5} \right = \frac{1}{3}$ $x = -11/30$ và $x = -1/30$ b) $\frac{3}{4} - 2x + 1 = \frac{7}{8}$ Không có giá trị của x thỏa mãn.	0.5 0.5
4	a, Để chứng tỏ $DE = 2AM$ tạo ra đoạn thẳng gấp đôi AM bằng cách trên tia đối MA lấy $MK = MA$ và đi chứng minh $DE = AK$ Xét $\triangle ABK$ & $\triangle DAE$: $AD = AB(gt)$; $AE = BK (= AC)$ Và $\angle DAE + \angle BAC = 180^\circ (\angle DAB + \angle EAC = 180^\circ)$	2



$ABC + CBK = ABC + ACB \quad (2)$ $\Rightarrow ABK + BAC = 180^\circ$ $ABK = DAE \Rightarrow \triangle ABK = \triangle DAE$ Vậy: $\Rightarrow AK = DE \Rightarrow AM = \frac{DE}{2}$ b, Gọi H là giao điểm AM & DE ; Ta có $\hat{BAK} + \hat{DAH} = 90^\circ \Rightarrow \hat{D} + \hat{DAH} = 90^\circ \Rightarrow \hat{ADH} = 90^\circ$	1
---	----------

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
TRỰC NINH

ÀO CHỖNH THỎC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

N^o M Hã C: 2008 - 2009

MÔN: TOÁN 7

(Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao ®))

Ô thi nuy gảm 01 trang

Bui 1: (3,5 ®iÓm)

Thực hiÕn phĐp tÝnh:

a) $\left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11}\right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11}\right) : \frac{7}{11}$

b) $\frac{1}{99.97} - \frac{1}{97.95} - \frac{1}{95.93} - \dots - \frac{1}{5.3} - \frac{1}{3.1}$

Bui 2: (3,5 ®iÓm)

T×m x; y; z biÕt:

a) $2009 - |x - 2009| = x$

b) $(2x - 1)^{2008} + \left(y - \frac{2}{5}\right)^{2008} + |x + y - z| = 0$

Bui 3: (3 ®iÓm)

T×m 3 sè a; b; c biÕt: $\frac{3a - 2b}{5} = \frac{2c - 5a}{3} = \frac{5b - 3c}{2}$ vµ $a + b + c = -50$

Bui 4: (7 ®iÓm)

Cho tam gi,c ABC c©n (AB = AC ; gc A tĩ). Trn cnh BC lÊy ®iÓm D, trn tia ®i cnh CB lÊy ®iÓm E sao cho BD = CE. Trn tia ®i cnh CA lÊy ®iÓm I sao cho CI = CA.

C©u 1: Chøng minh:

a) $\triangle ABD = \triangle ICE$

b) $AB + AC < AD + AE$

C©u 2: Tĩ D vµ E kĩ c,c ®-ng thng cng vung gc vi BC ct AB; AI theo thø tù ti M; N. Chøng minh BM = CN.

C©u 3: Chøng minh rng chu vi tam gi,c ABC nh h-n chu vi tam gi,c AMN.

Bài 5 (3 điểm):

Tìm các số tự nhiên a, b sao cho $(2008a + 3b + 1) \cdot (2008^a + 2008a + b) = 225$

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN 7-TRỰC NHÌN

Bài 1: 3 điểm

Câu a: 1 điểm (kết quả = 0).

Câu b: 2 điểm

$$\begin{aligned} & \frac{1}{99.97} - \frac{1}{97.95} - \frac{1}{95.93} - \dots - \frac{1}{5.3} - \frac{1}{3.1} \\ &= \frac{1}{99.97} - \left(\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{95.97} \right) \\ &= \frac{1}{99.97} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{95} - \frac{1}{97} \right) \\ &= \frac{1}{99.97} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{97} \right) \\ &= \frac{1}{99.97} - \frac{48}{97} \\ &= \frac{-4751}{99.97} \end{aligned}$$

Bài 2: 3,5 điểm

Câu a: 2 điểm

$$\begin{aligned} \text{- Nếu } x \geq 2009 &\Rightarrow 2009 - x + 2009 = x \\ &\Rightarrow 2 \cdot 2009 = 2x \\ &\Rightarrow x = 2009 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Nếu } x < 2009 &\Rightarrow 2009 - 2009 + x = x \\ &\Rightarrow 0 = 0 \end{aligned}$$

Vậy với $\forall x < 2009$ đều thỏa mãn.

$$\text{- Kết luận: với } x \leq 2009 \text{ thì } 2009 - |x - 2009| = x$$

Hoặc cách 2:

$$\begin{aligned} & 2009 - |x - 2009| = x \\ &\Rightarrow 2009 - x = |x - 2009| \\ &\Rightarrow |x - 2009| = -(x - 2009) \\ &\Rightarrow x \leq 2009 \end{aligned}$$

Câu b: 1,5 điểm

$$x = \frac{1}{2}; y = \frac{2}{5}; z = \frac{9}{10}$$

Bui 3: 2,5 @iÓm

$$\frac{3a-2b}{5} = \frac{2c-5a}{3} = \frac{5b-3c}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{15a-10b}{25} = \frac{6c-15a}{9} = \frac{10b-6c}{4}$$

p đông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau c¶:


$$\frac{15a-10b}{25} = \frac{6c-15a}{9} = \frac{10b-6c}{4} = \frac{15a-10b+6c-15a+10b-6c}{38} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 15a - 10b = 0 \\ 6c - 15a = 0 \\ 10b - 6c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a = 2b \\ 2c = 5a \\ 5b = 3c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a}{2} = \frac{b}{3} \\ \frac{a}{2} = \frac{c}{5} \\ \frac{c}{5} = \frac{b}{3} \end{cases}$$

$$\text{V}\ddot{\text{E}}\text{y} \frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5}$$

đồng tYnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau $\Rightarrow \begin{cases} a = -10 \\ b = -15 \\ c = -25 \end{cases}$

Bui 4: 7 @iÓm



Câu 1: mçi cCu cho 1,5 RiÓm

C©u a: Chứng minh $\triangle ABD = \triangle ICE$ (cgc)

$$C \oplus u \ b: c \tilde{a} \ AB + AC = AI$$

V× $\triangle ABD = \triangle ICE \Rightarrow AD = EI$ (2 cạnh tương ứng)

,p đồng bết $\frac{1}{4}$ ng thóc tam gi,c trong $\triangle AEI$ cả:

$$AE + EI > AI \text{ hay } AE + AD > AB + AC$$

Câu 2: 1,5 điểm

Chứng minh $\triangle \surd BDM = \triangle \surd CEN$ (g.c.g)

$$\Rightarrow BM = CN$$

Câu 3: 2,5 điểm

$$V \times BM = CN \Rightarrow AB + AC = AM + AN \quad (1)$$

$$\text{cả } BD = CE \text{ (gt)} \Rightarrow BC = DE$$

Giai giao điểm của MN với BC tại O ta có:

$$\left. \begin{array}{l} MO > OD \\ NO > OE \end{array} \right\} \Rightarrow MO + NO > OD + OE$$

$$\Rightarrow MN > DE$$

$$\Rightarrow MN > BC \quad (2)$$

Tổ (1) và (2) $\Rightarrow$ chu vi $\triangle ABC$ nhỏ hơn chu vi $\triangle AMN$

Bài 5: 2 điểm

Theo bài $\Rightarrow 2008a + 3b + 1$ và $2008^a + 2008a + b$ là 2 số lẻ.

$$\text{Nếu } a \neq 0 \Rightarrow 2008^a + 2008a \text{ là số chẵn}$$

$$\text{Nếu } 2008^a + 2008a + b \text{ lẻ} \Rightarrow b \text{ lẻ}$$

$$\text{Nếu } b \text{ lẻ} \Rightarrow 3b + 1 \text{ chẵn do } \text{b} \text{ lẻ}$$

$$2008a + 3b + 1 \text{ chẵn (khác } \text{m} \cdot \text{n)}$$

$$\text{Vậy } a = 0$$

$$\text{Với } a = 0 \Rightarrow (3b + 1)(b + 1) = 225$$

$$V \times b \in \mathbb{N} \Rightarrow (3b + 1)(b + 1) = 3 \cdot 75 = 5 \cdot 45 = 9 \cdot 25$$

$$3b + 1 \text{ không chia hết cho 3 và } 3b + 1 > b + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3b + 1 = 25 \\ b + 1 = 9 \end{cases} \Rightarrow b = 8$$

$$\text{Vậy } a = 0 ; b = 8.$$

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆT YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2012-2013

MÔN THI: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (4,0 điểm)

$$1) M = \left(\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7} \right) : \frac{2012}{2013}$$

2) Tìm x, biết: $|x^2 + |x - 1|| = x^2 + 2$.

Câu 2. (5,0 điểm)

1) Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thỏa mãn điều kiện: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b}$.

Hãy tính giá trị của biểu thức $B = \left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(1 + \frac{a}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{b}\right)$.

2) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

Câu 3. (4,0 điểm)

1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |2x - 2| + |2x - 2013|$ với x là số nguyên.

2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $x + y + z = xyz$.

Câu 4. (6,0 điểm)

Cho $\angle xAy = 60^\circ$ có tia phân giác Az. Từ điểm B trên Ax kẻ BH vuông góc với Ay tại H, kẻ BK vuông góc với Az và Bt song song với Ay, Bt cắt Az tại C. Từ C kẻ CM vuông góc với Ay tại M. Chứng minh:

a) K là trung điểm của AC.

b) $\triangle KMC$ là tam giác đều.

c) Cho $BK = 2\text{cm}$. Tính các cạnh $\triangle AKM$.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho ba số dương $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$ chứng minh rằng: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$

-----Hết-----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh:Số báo danh:.....

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN**

**HD CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 120 phút**

Câu	Nội dung	Điểm
-----	----------	------

Câu 1 (4 điểm)	$1) \text{ Ta có: } M = \left(\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7} \right) : \frac{2012}{2013}$ $= \left(\frac{\frac{2}{5} - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{\frac{7}{5} - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}}{\frac{7}{6} - \frac{7}{8} + \frac{7}{10}} \right) : \frac{2012}{2013}$ $= \left(\frac{2\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right)}{7\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{11}\right)} - \frac{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)}{2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)} \right) : \frac{2012}{2013}$ $= \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{7} \right) : \frac{2012}{2013} = 0$	0.5đ
	KL:.....	0.5đ
	2) vì $x^2 + x-1 > 0$ nên (1) $\Rightarrow x^2 + x-1 = x^2 + 2$ hay $ x-1 = 2$	0.5đ
	+) Nếu $x \geq 1$ thì (*) $\Rightarrow x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$	0.5đ
	+) Nếu $x < 1$ thì (*) $\Rightarrow x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1$	0.5đ
	KL:.....	0.5đ
Câu 2 (5 điểm)	1) +Nếu $a+b+c \neq 0$ Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c+b+c-a+c+a-b}{a+b+c} = 1$	0.25đ
	mà $\frac{a+b-c}{c} + 1 = \frac{b+c-a}{a} + 1 = \frac{c+a-b}{b} + 1 = 2$	0.25đ
	$\Rightarrow \frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = 2$	0.25đ
	Vậy $B = \left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(1 + \frac{a}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{b}\right) = \left(\frac{b+a}{a}\right)\left(\frac{c+a}{c}\right)\left(\frac{b+c}{b}\right) = 8$	0.25đ
	+Nếu $a+b+c = 0$ Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c+b+c-a+c+a-b}{a+b+c} = 0$	0.25đ
	mà $\frac{a+b-c}{c} + 1 = \frac{b+c-a}{a} + 1 = \frac{c+a-b}{b} + 1 = 1$	0.25đ
	$\Rightarrow \frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = 1$	0.25đ
	Vậy $B = \left(1 + \frac{b}{a}\right)\left(1 + \frac{a}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{b}\right) = \left(\frac{b+a}{a}\right)\left(\frac{c+a}{c}\right)\left(\frac{b+c}{b}\right) = 1$	0.25đ
	2) Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x (x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a,	0,5 đ

	b, c Ta có: $\frac{a}{5} = \frac{b}{6} = \frac{c}{7} = \frac{a+b+c}{18} = \frac{x}{18} \Rightarrow a = \frac{5x}{18}; b = \frac{6x}{18} = \frac{x}{3}; c = \frac{7x}{18}$ (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a', b', c', ta có: $\frac{a'}{4} = \frac{b'}{5} = \frac{c'}{6} = \frac{a'+b'+c'}{15} = \frac{x}{15} \Rightarrow a' = \frac{4x}{15}; b' = \frac{5x}{15} = \frac{x}{3}; c' = \frac{6x}{15}$ (2) So sánh (1) và (2) ta có: $a > a'; b = b'; c < c'$ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vậy: $c' - c = 4$ hay $\frac{6x}{15} - \frac{7x}{18} = 4 \Rightarrow \frac{x}{90} = 4 \Rightarrow x = 360$ Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói.	0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ
Câu 3 (4 điểm)	1) Ta có: $A = 2x-2 + 2x-2013 = 2x-2 + 2013-2x$ $\geq 2x-2+2013-2x = 2011$ Dấu “=” xảy ra khi $(2x-2)(2013-2x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq \frac{2013}{2}$ KL:.....	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
	2) Vì x,y,z nguyên dương nên ta giả sử $1 \leq x \leq y \leq z$ Theo bài ra $1 = \frac{1}{yz} + \frac{1}{yx} + \frac{1}{zx} \leq \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{x^2}$ $\Rightarrow x^2 \leq 3 \Rightarrow x = 1$ Thay vào đầu bài ta có $1+y+z = yz \Rightarrow y - yz + 1 + z = 0$ $\Rightarrow y(1-z) - (1-z) + 2 = 0$ $\Rightarrow (y-1)(z-1) = 2$ TH1: $y-1 = 1 \Rightarrow y=2$ và $z-1 = 2 \Rightarrow z=3$ TH2: $y-1 = 2 \Rightarrow y=3$ và $z-1 = 1 \Rightarrow z=2$ Vậy có hai cặp nghiệm nguyên thỏa mãn (1,2,3); (1,3,2)	0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Câu 4 (6 điểm)	Vẽ hình, GT_KL  a, $\triangle ABC$ cân tại B do $CAB = ACB (= MAC)$ và BK là đường cao $\Rightarrow$ BK là đường trung tuyến $\Rightarrow$ K là trung điểm của AC b, $\triangle ABH = \triangle BAK$ (cạnh huyền + góc nhọn)	0,25đ 1đ 1đ 0,5đ

	$\Rightarrow BH = AK$ (hai cạnh t. ư) mà $AK = \frac{1}{2} AC$	0,25đ
	$\Rightarrow BH = \frac{1}{2} AC$	0,25đ
	Ta có : $BH = CM$ (t/c cặp đoạn chắn) mà $CK = BH = \frac{1}{2} AC \Rightarrow CM = CK$	0,25đ
	$\Rightarrow \Delta MKC$ là tam giác cân (1)	0,5đ
	Mặt khác : $MCB = 90^0$ và $ACB = 30^0$	
	$\Rightarrow MCK = 60^0$ (2)	0,25đ
	Từ (1) và (2) $\Rightarrow \Delta MKC$ là tam giác đều	0,25đ
	c) Vì ΔABK vuông tại K mà góc $KAB = 30^0 \Rightarrow AB = 2BK = 2.2 = 4\text{cm}$	0,25đ
	Vì ΔABK vuông tại K nên theo Pitago ta có:	0,25đ
	$AK = \sqrt{AB^2 - BK^2} = \sqrt{16 - 4} = \sqrt{12}$	0,25đ
	Mà $KC = \frac{1}{2} AC \Rightarrow KC = AK = \sqrt{12}$	0,25đ
	ΔKCM đều $\Rightarrow KC = KM = \sqrt{12}$	0,25đ
	Theo phần b) $AB = BC = 4$	0,5đ
	$AH = BK = 2$	
	$HM = BC$ (HBCM là hình chữ nhật)	0,25đ
	$\Rightarrow AM = AH + HM = 6$	
Câu 5 (1 điểm)	Vì $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$ nên: $(a-1)(b-1) \geq 0 \Leftrightarrow ab+1 \geq a+b \Leftrightarrow \frac{1}{ab+1} \leq \frac{1}{a+b} \Leftrightarrow \frac{c}{ab+1} \leq \frac{c}{a+b}$ (1) Tương tự: $\frac{a}{bc+1} \leq \frac{a}{b+c}$ (2) ; $\frac{b}{ac+1} \leq \frac{b}{a+c}$ (3) Do đó: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$ (4) Mà $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{2a}{a+b+c} + \frac{2b}{a+b+c} + \frac{2c}{a+b+c} = \frac{2(a+b+c)}{a+b+c} = 2$ (5) Từ (4) và (5) suy ra: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$ (đpcm)	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ

Lưu ý: - Các tổ cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn trước khi chấm.

- Học sinh làm bài các cách khác nhau mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
- Bài hình không có hình vẽ thì không chấm.
- Tổng điểm của bài cho điểm lẻ đến 0,25đ (ví dụ : 13,25đ , 14,5đ , 26,75đ).

PHÒNG GD & ĐT CHƯƠNG MỸ

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC: 2014 - 2015

Môn thi: TOÁN 7

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 1 trang)

Câu 1.

- a. Thực hiện phép tính: $\frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,265 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} + \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$
- b. So sánh: $\sqrt{50} + \sqrt{26} + 1$ và $\sqrt{168}$.

Câu 2.

- a. Tìm x biết: $|x - 2| + |3 - 2x| = 2x + 1$
- b. Tìm $x; y \in \mathbb{Z}$ biết: $xy + 2x - y = 5$
- c. Tìm $x; y; z$ biết: $2x = 3y; 4y = 5z$ và $4x - 3y + 5z = 7$

Câu 3.

- a. Tìm đa thức bậc hai biết $f(x) - f(x-1) = x$.
Từ đó áp dụng tính tổng $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$.
- b. Cho $\frac{2bz - 3cy}{a} = \frac{3cx - az}{2b} = \frac{ay - 2bx}{3c}$ Chứng minh: $\frac{x}{a} = \frac{y}{2b} = \frac{z}{3c}$.

Câu 4.

Cho tam giác ABC ($\angle BAC < 90^\circ$), đường cao AH. Gọi E; F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB; AC, đường thẳng EF cắt AB; AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:

- a. $AE = AF$;
b. HA là phân giác của $\angle MHN$;
c. $CM \parallel EH$; $BN \parallel FH$.

Hết./.

Họ và tên:Số báo danh:.....

PHÒNG GD & ĐT CHƯƠNG MỸ

ĐÁP ÁN THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI. NĂM HỌC: 2012 - 2013

Môn thi: TOÁN 7

		Áp dụng: + Với $x = 1$ ta có : $1 = f(1) - f(0)$. + Với $x = 2$ ta có : $1 = f(2) - f(1)$. + Với $x = n$ ta có : $n = f(n) - f(n-1)$. $\Rightarrow S = 1+2+3+\dots+n = f(n) - f(0) = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + c - c = \frac{n(n+1)}{2}$.	0.25
	b. 1 điểm	$\frac{2bz-3cy}{a} = \frac{3cx-az}{2b} = \frac{ay-2bx}{3c} \Leftrightarrow$ $\frac{2abz-3acy}{a^2} = \frac{6bcx-2abz}{4b^2} = \frac{3acy-6bcx}{9c^2}$ $= \frac{2abz-3acy+6bcx-2abz+3acy-6bcx}{a^2+4b^2+9c^2} = 0$ $\Rightarrow 2bz - 3cy = 0 \Rightarrow \frac{z}{3c} = \frac{y}{2b} \quad (1)$ $\Rightarrow 3cx - az = 0 \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{z}{3c} \quad (2);$ Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{x}{a} = \frac{y}{2b} = \frac{z}{3c}$	0.5 0.25 0.25
Câu 4 3 điểm	Hình vẽ 0.5 đ		0.25
	a. 1 điểm	Vì AB là trung trực của EH nên ta có: $AE = AH \quad (1)$ Vì AC là trung trực của HF nên ta có: $AH = AF \quad (2)$ Từ (1) và (2) suy ra: $AE = AF$	0.25 0.25 0.5
	b. 1 điểm	Vì $M \in AB$ nên MB là phân giác $\angle EMH \Rightarrow MB$ là phân giác ngoài góc M của tam giác MNH Vì $N \in AC$ nên NC là phân giác $\angle FNH \Rightarrow NC$ là phân giác ngoài góc N của tam giác MNH Do MB; NC cắt nhau tại A nên HA là phân giác trong góc H của tam giác HMN hay HA là phân giác của $\angle MHN$.	0.25 0.25 0.25 0.25

	c. 1 điểm	Ta có $AH \perp BC$ (gt) mà HM là phân giác $MHN \Rightarrow HB$ là phân giác ngoài góc H của tam giác HMN	0.25
		MB là phân giác ngoài góc M của tam giác HMN (cmt) $\Rightarrow NB$ là phân giác trong góc N của tam giác HMN	0.25
		$\Rightarrow BN \perp AC$ (Hai đường phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau). $\Rightarrow BN \parallel HF$ (cùng vuông góc với AC)	0.25
		Chứng minh tương tự ta có: $EH \parallel CM$	

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 7 THCS - Năm học 2010 – 2011
MÔN : TOÁN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(đề thi gồm 1 trang)

Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2.0 điểm) Thực hiện tính:

$$A = \frac{11}{24} - \frac{5}{41} + \frac{13}{24} + 0,5 - \frac{36}{41}$$

$$B = 7\frac{2}{7}\left(-\frac{2}{5}\right) - 2\frac{2}{7}\left(-\frac{2}{5}\right)$$

Câu 2: (2.0 điểm)

a. Tìm x, y biết: $\frac{4+x}{7+y} = \frac{4}{7}$ và $x + y = 22$

b. Cho $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ và $\frac{y}{5} = \frac{z}{6}$. Tính $M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z}$


Câu 3: (2.0 điểm) Thực hiện tính:

a. $S = 2^{2010} - 2^{2009} - 2^{2008} \dots - 2 - 1$

b. $P = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{16}(1+2+3+\dots+16)$

Câu 4: (1.0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x$.

Câu 5: (3.0 điểm) Cho tam giác ABC có $A = 90^\circ$, $B = 50^\circ$. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Gọi d là đường thẳng vuông góc với BC tại B. Trên đường thẳng d thuộc nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy điểm D sao cho $BD = HA$ (Hình vẽ bên).



- Chứng minh $\triangle ABH = \triangle DHB$.
- Tính số đo góc BDH.
- Chứng minh đường thẳng DH vuông góc với đường thẳng AC.

Hết

Họ và tên thí sinh: Số báo danh
 Chữ ký giám thị 1: Giám thị 2

ĐÁP ÁN-CHÂU THÀNH

Câu 1: (Mỗi bước cho 0,25 điểm)

$$\begin{aligned} A &= \frac{11}{24} + \frac{13}{24} - \frac{5}{41} - \frac{36}{41} + 0,5 \\ &= \frac{24}{24} - \frac{41}{41} + 0,5 \\ &= 1 - 1 + 0,5 \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -\frac{2}{5} \left(7\frac{2}{7} - 2\frac{2}{7} \right) \\ &= -\frac{2}{5} \left(7 + \frac{2}{7} - 2 - \frac{2}{7} \right) \\ &= -\frac{2}{5} (5) \\ &= -2 \end{aligned}$$

Câu 2:

a) $\Rightarrow 28 + 7x = 28 + 4y$ 0,25 đ

$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{x+y}{4+7}$ 0,25 đ

$\Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{7} = \frac{22}{11} = 2 \Rightarrow x = 8; y = 14$ 0,25 đ

b) $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20}; \frac{y}{5} = \frac{z}{6} \Rightarrow \frac{y}{20} = \frac{z}{24} \Rightarrow \frac{x}{15} = \frac{y}{20} = \frac{z}{24}$ (1) 0,25 đ

(1) $\Rightarrow \frac{2x}{30} = \frac{3y}{60} = \frac{4z}{96} = \frac{2x+3y+4z}{30+60+96}$ 0,25 đ

(1) $\Rightarrow \frac{3x}{45} = \frac{4y}{80} = \frac{5z}{120} = \frac{3x+4y+5z}{45+80+120}$ 0,25 đ

$$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{30+60+96} \cdot \frac{3x+4y+5z}{45+80+120} = \frac{2x}{30} \cdot \frac{3x}{45} \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\Rightarrow \frac{2x+3y+4z}{186} \cdot \frac{245}{3x+4y+5z} = 1 \Rightarrow M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z} = \frac{186}{245} \quad 0,25 \text{ đ}$$

Câu 3:

a)

$$2S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2009} \dots - 2^2 - 2 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$2S - S = 2^{2011} - 2^{2010} - 2^{2010} - 2^{2009} + 2^{2009} \dots - 2^2 + 2^2 - 2 + 2 + 1 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$S = 2^{2011} - 2 \cdot 2^{2010} + 1 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$S = 2^{2011} - 2^{2011} + 1 = 1 \quad 0,25 \text{ đ}$$

b)

$$P = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2.3}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3.4}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4.5}{2} + \dots + \frac{1}{16} \cdot \frac{16.17}{2} \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$= \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{17}{2} \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$= \frac{1}{2}(1+2+3+\dots+17-1) \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{17.18}{2} - 1 \right) = 76 \quad 0,25 \text{ đ}$$

Câu 4: (Mỗi bước cho 0,25 điểm)

- Vẽ hệ trục tọa độ

- Xác định tọa độ một điểm $A \neq O$ thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x$

- Biểu diễn điểm A.

- Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x$ (Đường thẳng OA)

Câu 5: (Mỗi bước cho 0,25 điểm)

a. Xét $\triangle ABH$ và $\triangle DHB$ có:

$$B = H (= 90^\circ)$$

HB chung

$$BD = HA$$

$$\Rightarrow \triangle ABH = \triangle DHB \text{ (c-g-c)}$$

b. Xét $\triangle ABH$ có $B = 50^\circ$ và $H = 90^\circ$


$$\Rightarrow \angle BAH = 180 - (B + H) = 40^\circ.$$

Từ $\triangle ABH = \triangle DHB$ có:

$$\angle BAH = \angle BDH$$

$$\Rightarrow \angle BDH = 40^\circ.$$

c. Từ $\triangle ABH = \triangle DHB$ có:



$$\widehat{ABH} = \widehat{DHB}$$

$\Rightarrow$ AB song song với DH.

$$AB \perp AC$$

$\Rightarrow DH \perp AC$

